

الكتاب المفتوح

للفصل الثالث المتوسط

تأليف

أ. د. سرمد بهجت ديكران
أ. د. مهند جميل محمود
سالم محمد سيد النصراوي
ماجد حسين خلف الجصاني

أ. د. عمار هاني سهيل الدجبلی
د. سمير حکیم کریم
د. سعدی محمد ظاهر
کاظم رشید موسى
کریم عبد الحسین الکنائی

المشرف العلمي على الطبع : محمد عبد الخالق حسين
المشرف الفني على الطبع : سارة خليل إبراهيم

التصميم : أحمد عبد الصاحب ناجي

الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

www.manahj.edu.iq
manahjb@yahoo.com
Info@manahj.edu.iq



[manahjb](#)

[manahj](#)



استناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداؤله في الأسواق

مقدمة

بما أن الصف الثالث المتوسط (السنة التاسعة من العمر المدرسي للطالب) يمثل نهاية مرحلة واعداً الطالب على مفترق طرق يختار منها ما يلائم توجهاته في الحياة . . (علمي ، أدبي ، مهني ، ...) فقد كان لهذا الجانب الحيوي الدساس أثر واضح في وضع محتوى مفردات كتاب الكيمياء للثالث المتوسط من حيث:

- ١- تهيئة الطالب للتخصص في المجالات العلمية المتنوعة.
- ٢- إطلاع الطالب على أحدث التطورات العلمية في حقل الكيمياء ودورها الفاعل في قيادة ركب التقدم العلمي - عالمياً - .
- ٣- التخفيف - ضمن الحدود التربوية والنفسية - من الجوانب النظرية والرياضية المرهقة، سيما وأن الطالب يمر في هذه المرحلة من عمره بما يرافق نضجه المهاري والإنساني من تغيرات فسيولوجية تتطلب منه نوعاً من تركيز الذهن لمتابعة أمور الحياة كافة.

كل هذه الأمور وضعتها لجنة التأليف أما ماما في إنتقاء محتوى المفردات بحيث يرى الكتاب النور ولما ينزل بحاجة ماسة لآراء المدرسين وأولئك الأمور والتربويين الميدانيين بعد أن تتم تجربة الكتاب في عامه الدراسي الأول بعون الله.

غير أن تنفيذ المنهج وفق خطة مرسومة مسبقاً لابد وأن يعتمد جدياً على الجانب العملي المثري والمشوق للطلبة والذي يختصر الوقت للمدرس ويثبت المعلومات النظرية ويعمق إستيعابها لدى الطلبة معتمدين أساساً على:

- ١- ما توفره البيئة المحلية من مواد سداً للنقص الذي قد يحصل في موجودات المختبر المدرسي.
- ٢- المناقلة بين المدارس القريبة.

٣- التنسيق مع شعبة المختبرات في قسم الشؤون الفنية ومركز الوسائل التعليمية (أو شعبة التقنيات)، وهنا نود التأكيد على ذكر كتابي الكيمياء للصفين الأول والثاني من ضرورة التنسيق بين مدرس الكيمياء وإدارة المدرسة لتنظيم سفرات نوعية (علمية ترفيهية في الوقت نفسه) للمعامل والمصانع القريبة من المدرسة لإطلاع الطلبة - ميدانياً - على مراحل التصنيع المختلفة وتکليف الطلبة - كمجاميع - لإعداد تقارير (يكافئون عنها) لتشدهم إلى التطور العلمي السريع النافع .

وهنا نود الإشارة الى أن لجنة التأليف -إضافة للمذكورة أسماؤهم على الغلاف- قد
ضمت كُلًا من هدى صلاح كريم وذلود مهدي سالم وأكرم حنا إيليا وذليل رحيم
علي وباسل ابراهيم الشوك. كما وتود اللجنة ان تقدم شكرها وتقديرها للخبريين
العلميين الاستاذ الدكتور عبد المحسن عبد الحميد الحيدري والسيد جمال محمد
موسى الاسدي على مراجعتهم مسودة الكتاب.

أملين من كل من يهمه أمر تطوير الكتاب ، رفد المديرية العامة للمناهج
-تحريرياً - بكل ما يسهم في التطوير والتنقيح المستمر بما يواكب المسيرة العلمية
المتسارعة والله الموفق. لجنة التأليف.

الفهرس

الفصل الأول

التركيب الذري للمادة

13

14	مقدمة الفصل
14	تطور مفهوم البناء الذري
15	مدخل إلى البناء الإلكتروني الحديث
17	مستويات الطاقة
21	الترتيب الإلكتروني
25	ترتيب لويس (رمز لويس)
27	الجدول الدوري
28	تصنيف العناصر في الجدول الدوري تبعاً لترتيبها الإلكتروني
30	كيفية معرفة الدورة والزمرة التي يقع فيها أي عنصر من عناصر المجموعة A
33	الخواص الدورية
38	اسئلة الفصل

الفصل الثاني

الزمتان الأولى والثانية IA و IIA

41

42	عناصر الزمرتين IA و IIA
42	الصفات العامة لعناصر الزمرتين IA و IIA
45	الصوديوم
50	الكالسيوم
52	اسئلة الفصل

الفهرس

الفصل الثالث

الزمرة الثالثة IIIA

53

54	عناصر الزمرة IIIA
54	الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة IIIA
56	الالمنيوم
57	خواص الالمنيوم
60	استعمالات الالمنيوم
61	سبائك الالمنيوم
61	مركبات الالمنيوم
63	الكشف عن ايون الالمنيوم في محليل مركباته
64	اسئلة الفصل

الفصل الرابع

المحاليل والتعبير عن التركيز

65

66	المحلول
67	طبيعة المحاليل
68	قابلية الذوبان
70	تركيز المحلول
70	التركيز بالنسبة المئوية الكتليلية
72	التركيز بالنسبة المئوية الحجمية
74	التركيز بالكتلة/الحجم
76	اسئلة الفصل

الفهرس

الفصل الخامس

الزمرة الرابعة IVA

79

80

عناصر الزمرة الرابعة IVA

80

الصفات العامة للزمرة الرابعة IVA

81

السليكون

82

وجوده

82

تحضيره

84

خواص السليكون

85

مركبات السليكون

88

اسئلة الفصل

الفصل السادس

مدخل في الكيمياء العضوية

89

90

أهمية المركبات العضوية

91

صفات المركبات العضوية

91

الإواصار التساهمية لذرة الكربون في المركبات العضوية

94

غاز الميثان

95

الإثيلين

97

الاستيلين

99

كحول الإثيل (الإيثanol) C_2H_5OH

100

حامض الخليك CH_3COOH

101

البنزين أو البنزول C_6H_6

101

الفينول C_6H_5OH

102

اسئلة الفصل

الفهرس

الفصل السابع

الزمرة الخامسة VA

103

104	عناصر الزمرة الخامسة VA
104	الصفات العامة للزمرة الخامسة VA
105	النتروجين
106	تحضير غاز النتروجين
107	خواص غاز النتروجين
108	بعض مركبات النتروجين
108	غاز الامونيا NH_3
109	الخواص الفيزيائية للامونيا
111	الخواص الكيميائية للامونيا
111	حامض النتريك
113	الفسفور
114	خواص الفسفور
116	بعض مركبات الفسفور
116	الاستعمالات الصناعية لبعض مركبات الفسفور
117	الاسمدة الفوسفاتية
119	اسئلة الفصل

الفهرس

الفصل الثامن

الزمرة السادسة VIA

121

122	الصفات العامة للزمرة السادسة VIA
123	الكبريت
124	استخراج الكبريت
125	الخواص العامة للكبريت
127	بعض مركبات الكبريت
127	غاز ثنائي اوكسيد الكبريت SO_2
129	غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S
130	حامض الكبريتيك H_2SO_4
132	الكبريتات
133	الكشف عن ايون الكبريتات
134	اسئلة الفصل

الفصل التاسع

الزمرة السابعة VIIA

135


136	عناصر الزمرة السابعة
136	الصفات العامة للزمرة السابعة الهالوجينات
137	غاز الكلور
138	تحضير غاز الكلور
139	خواص غاز الكلور
141	غاز كلوريد الهيدروجين
142	خواص كلوريد الهيدروجين
145	الكلوريديات
146	اسئلة الفصل

أشكال واسماء بعض الادوات المختبرية





دوراتي دائرية



كالسي حجمية




ملاقط



حامل البايب اختبار



دوراتي سطح وعلبة



اسطوانات مفرضة



مساون و مدق



الماءع (رجاجة)



سدادات مطاطية



مجففة



فرش البايب اختبار




ثقبة عمل

ارشادات بيئية

بيئة نظيفة تعني حياة افضل .
عندما تكون للبيئة اولوية ... البيئة تدوم
الماء شريان الحياة فحافظ عليه من التلوث .
حماية البيئة مسؤولية الجميع فلنعمل لحمايتها .
البيئة ملك لك ولا جيالك القادمة فحافظ عليها من التلوث .
بالتشجير تصبح بيئتك ابهى .
لنعمل من اجل بيئه افضل ووطن اجمل .
إن اقتلعت شجرة او ثبته مضطراً فائز ع غيرها .
من اجل بيئه اجمل ازرع ولا تقطع .
حافظ على بيئتك لتنعم بحياة افضل .
بيئة الانسان مرآة لوعيه .
بيئتك كطفلك كلما حافظت عليه ازداد بهاءاً
لنعمل معاً ... من اجل عراق خال من التلوث .
يد بيد من اجل وطن اجمل .
بيئتك حياتك ... فساهم من اجل جعلها مشرقة .
البيئة السليمة تبدأ بك .
من اجل الحياة على الارض ... انقذوا انهارها .
البيئة بيتنا الكبير ... فلنعمل على جعله صحيحاً ونظيفاً .
الي ابي وامي ... ساهمما في حماية البيئة لتخمنا لي مستقبل افضل .

التركيب الذري للمادة

Atomic Structure for Matter



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على أن :

- يتعرف على تطور المفهوم الذري.
- يفهم النظرية الذرية الحديثة.
- يتمكن من كتابة الترتيب الإلكتروني.
- يتعرف على ترتيب لويس للعناصر.
- يستوعب فكرة متطرورة عن الجدول الدوري.
- يدرك الخواص الدورية للعناصر حسب ترتيبها في الجدول الدوري.

1 - 1 مقدمة

سبق ان تعلمت في السينين السابقة لدراستك لعلم الكيمياء أن جميع المواد الموجودة في الكون تتكون من جسيمات صغيرة تشكل الوحدات الأساسية لبناء هذه المواد سميت بالذرات (Atoms) والتي تعني في اللغة اللاتينية غير القابلة للانقسام، ولقد مر تفسير البناء الذري خلال القرنين الماضيين بعده نظريات وسندرس في هذا الفصل كيفية الوصول الى آخر النظريات الحديثة لمعرفة البناء الذري.

هل تعلم

الرأي هو فكرة ليست مؤكدة اما النظرية فأنها تستخدم اسباب لشرح ملاحظات وبيانات مختبرية.

1 - 2 تطور مفهوم البناء الذري

اقترح العلماء نماذج مختلفة لتركيب الذرة وكل نموذج كان الافضل في وقته، ثم نتيجة الملاحظات والتجارب اخذ النموذج يتتطور وصولاً للاكثر قبولاً من الناحية العلمية. وسنتعرف الى هذه النماذج حسب تسلسلها الزمني.

1 - 2 - 1 نموذج دالتون


في بداية القرن التاسع عشر تصور العالم دالتون الذرة على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام [الشكل (1 - 1)]، لكل عنصر نوع معين من الذرات الخاصة به وان هذه الذرات ترتبط بطرائق بسيطة لتكوين الذرات المركبة.



الشكل (1 - 1)
نموذج دالتون للذرة.

1 - 2 - 2 نموذج ثومسون

في نهاية القرن التاسع عشر قدم العالم ثومسون تصوراً آخر للذرة، (بعد اكتشافه ان الذرة تتكون من جسيمات أصغر تحمل شحنات سالبة أطلق عليها اسم الالكترونات)، بأنها كرة موجبة الشحنة تلتتصق عليها الالكترونات السالبة الشحنة التي تعادل الشحنة الموجبة للكرة لذا فانها متعادلة الشحنة. والشكل (1 - 2) يبين نموذج ثومسون للذرة.



الشكل (1 - 2)
نموذج ثومسون للذرة.

١ - ٢ - ٣ نموذج رذرفورد



الشكل (٣ - ١)
نموذج رذرفورد للذرة.

في اوائل القرن العشرين وبعد اكتشاف البروتون والذى هو جسيم موجب الشحنة كتلته اكبر بكثير من كتلة الالكترونات. قدم العالم رذرفورد تصوره بأن البروتونات متمرضة في حجم صغير في وسط الذرة اطلق عليه اسم النواة وانها تحتوي على معظم كتلة الذرة وان الالكترونات تدور حولها لذا فان اغلب حجم الذرة فراغ وان عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول النواة تعادل الشحنات الموجبة للبروتونات وهذه الالكترونات تدور بسرعة كبيرة وفي مدارات مختلفة البعد عن النواة كما تدور الكواكب حول الشمس لذا سمي هذا النموذج بالنموذج الكوكبي كما في الشكل (٣ - ١).


١ - ٣ مدخل الى البناء الالكتروني الحديث

هل تعلم

اذا فرضنا ان حجم ذرة ما بحجم ملعب لكرة القدم فأن نواة هذه الذرة المفترضة سوف تكون بحجم كرة زجاجية صغيرة جدا كالتي يلعب بها الأطفال.

نشأت مشكلة بالنسبة لنموذج رذرفورد الكوكبي. فلو فرضنا ان الالكترونات السالبة ساكنة (الافتراض الاول) فأنها سوف تنجدب الى النواة المخالفة لها بالشحنة لذا يجب ان تكون في حالة حركة (الافتراض الثاني) وبما ان الشحنات الكهربائية المتحركة تحت تأثير قوة جذب تطلق طاقة اذن سوف ينتج نتيجة لذلك فقدان في طاقة الالكترون المتحرك فتبطأ حركته مما يجعله يلف لولبياً وبالتالي يكون غير قادر على مقاومة جذب النواة ويسقط في النواة، لذا ففي كلتا الفرضيتين نجد ان الذرة سوف تنهار، وبما ان الذرات لا تنهار لذلك لا بد ان يكون هناك خطأ حسب المناقشة المذكورة اعلاه.

١ - ٣ - ٤ نموذج بور



الشكل (٤ - ١)
نموذج بور للذرة.

اقتصر العالم بور وهو عالم دنماركي عام 1913 ان الالكترونات تدور حول النواة في مستويات ذات طاقة وانصاف اقطار محددة [الشكل (٤ - ٤)], ولكل مستوى طاقة رقم يميزه ويصف طاقته يسمى بعدد الكم الرئيسي. فالالكترون في مستوى الطاقة الاول يكون عدد الكم الرئيسي

له مساوي لواحد اما الالكترون في مستوى الطاقة الثاني يكون عدد الكم الرئيسي له مساوي لاثنين، وهكذا..... ، وتزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النواة فمثلاً يكون مستوى الطاقة الرئيسي الاول ذا طاقة اقل من تلك التي يمتلكها مستوى الطاقة الثاني وهكذا. ويمكن للالكترون ان ينتقل بين مستويات الطاقة هذه عند اكتسابه او فقدانه للطاقة.


١ - ٣ - ٢ النظرية الذرية الحديثة

فسر نموذج بور تركيب ذرة الهيدروجين وهي ابسط نظام ذري لانها تحتوي على بروتون واحد والكترون واحد فقط، ولكن هذا النموذج فشل في تفسير بعض الظواهر الطبيعية للعناصر الاخرى التي تحتوي على عدد اكبر من الالكترونات. نشط الكثير من العلماء في وضع الاساس العلمي للنظرية الذرية الحديثة حيث طور العلماء نظرية تعرف بنظرية الكم والتي تنص على احتمال وجود الالكترون في حيز محدد في الفضاء المحيط بالنواة وليس في مدارات محددة الابعاد كما اوضح بور، أطلق عليه اسم الاوربيتال (Orbital) (سميت الاغلفة الالكترونية سابقاً) وهو ما يمكن وصفه بطريقة اخرى بأنه السحابة الالكترونية المحيطة بالنواة ويمكن ملاحظة ذلك كما في الشكل (1 - 5). وان لهذه الاوربيتالات الذرية احجاماً واشكالاً مختلفة. ويمكن تلخيص اهم فرض هذه النظرية الحديثة والتي هي نموذج معدل لنموذج بور حول تفسيره للذرة بالاتي:

١- تتكون الذرة من نواة تحيط بها الكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة.

٢- تدور الالكترونات حول النواة على مسافات بعيدة عنها (نسبة لحجم الذرة) في مستويات الطاقة ويعبر عن هذه المستويات باعداد تدعى اعداد الكم الرئيسية وهي عبارة عن اعداد صحيحة موجبة يرمز لها بالحرف (n).

- تمرين (1 - 1)
اختر الجواب الصحيح
مستوى الطاقة الرئيسية
الذي طاقته اعلى هو :
أ - مستوى الطاقة الرئيسية
الاول.
ب - مستوى الطاقة الرئيسية
الثاني.
ج - مستوى الطاقة الرئيسية
الثالث.
د - مستوى الطاقة الرئيسية
الرابع.



- الشكل (5 - 1)
احداش كالاوربيتالات
(السحابة الالكترونية).

- تمرين (2 - 1)
ما مفهوم السحابة
الالكترونية؟

اضافة الى ذلك وكما تعلمنا في المرحلة السابقة توجد النواة في مركز الذرة وتتضمن البروتونات والنيوترونات.

1 - 4 مستويات الطاقة

تعلمنا ان الالكترونات التي تدور بشكل مستمر حول النواة في مدارات مختلفة تمتلك طاقات مختلفة حيث انها تدور على ابعاد مختلفة وكلما كانت الطاقة التي يمتلكها الالكترون اكبر كلما اصبح مدار دورانه حول النواة ابعد. وللتعبير عن مستويات الطاقة المختلفة للالكترونات استخدم العلماء اعداداً تسمى باعداد کم ثانوية اخرى تصف بشكل تام جميع خواص الاوربيتال وخواص الالكترونات التي تحتويها وسنطرق في هذا الفصل الى احد هذه الاعداد وهو عدد الکم الرئيسي والذي سبقت الاشارة اليه.

1 - 4 - 1 مستويات الطاقة الرئيسية

يعبر عن هذه المستويات بعدها الکم الرئيسي ويرمز له بالحرف (n) ويأخذ قيمة صحيحة موجبة تساوي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، ويدل كل منها على مستوى طاقة معين يزيد بزيادة هذا العدد، ولا يأخذ (n) قيمة الصفر ابداً. ويمكن تمثيل مستويات الطاقة الرئيسية باعداد الکم الرئيسية المقابلة لها بحروف وارقام كما مبين في الجدول (1 - 1).

الجدول 1-1 رمز المستوى الرئيسي وأعداد الکم المقابلة لها


رمز المستوى	قيمة n
Q	7
P	6
O	5
N	4
M	3
L	2
K	1



ازدياد الطاقة

كلما كانت قيمة n كبيرة كانت المسافة التي يبعد بها الالكترون عن النواة اكبر وبالتالي زادت طاقته، اي ان اقرب هذه المستويات من النواة ($n = 1$) اقلها طاقة وان ($n=7$)

ابعدها عن النواة اكثراً طاقة واقلها ارتباطاً بالنواة مما يسهل فقدانه. لاحظ الشكل (1 - 6).





الشكل (6 - 1)

كلما زادت قيمة n زادت طاقة المستوى.


١ - ٤ - ٢ مستويات الطاقة الثانوية

تحتوي مستويات الطاقة الرئيسية (K و L و M و N و ...) على مستويات طاقة ثانوية يرمز لها بالحروف s و p و d و f و تختلف هذه المستويات خصوصاً من ناحية الشكل وعدد الالكترونات التي تحتويها حيث ان اوربيتال (s) له شكل كروي [الشكل (7 - 1)]. اما المستوى الثانوي (p) فله ثلاث اوربيتالات وكل اوربيتال مكون من فصين متكافئين موزعة في الفراغ بثلاث اتجاهات متعامدة يرمز لها (P_x و P_y و P_z)، وكما موضحة في الشكل (1 - 8). اما المستويين الثانويين (f و d) فلهمما اشكال فراغية اكثر تعقيداً.



الشكل (7 - 1)

الشكل الكروي للأوربيتال (s).




الشكل (8 - 1)

اشكال الاوربيتالات (p).

تحتوي مستويات الطاقة الرئيسية على مستويات الطاقة الثانوية وكما مبين في أدناه:

- * يحتوى المستوى الرئيسي $n = 1$ على مستوى ثانوي واحداً فقط من نوع s .
- * يحتوى المستوى الرئيسي $n = 2$ على مستويين ثانويين من نوع s و p .
- * يحتوى المستوى الرئيسي $n = 3$ على ثلاثة مستويات ثانوية من نوع s و p و d .
- * يحتوى المستوى الرئيسي $n = 4$ على أربعة مستويات ثانوية من نوع s و p و d و f .

ولتحديد المستوى الثانوي من اي مستوى من المستويات الرئيسية بطريقة رمزية تكتب قيمة n من المستوى الرئيسي ثم الحرف المخصص للمستوى الثانوي، فعلى سبيل المثال يكتب رمز المستوى الثانوي s بوضع رقم المستوى الرئيسي قبل المستوى الثانوي فيكون $2s$ والمستوى الثانوي d من المستوى الرئيسي الرابع هو $4d$ وهكذا، وكما موضح في الشكل (1 - 9).




الشكل (1 - 9)

مستويات الطاقة الثانوية التي توجد ضمن مستويات الطاقة الرئيسية.

٤-٣ عدد الاوربيتالات والالكترونات في المستويات الثانوية

تحتوي المستويات الثانوية على مجموعة من الاوربيتالات المختلفة التي يمكن الرمز لها بالمرربع  كما موضح أدناه:

- في المستوى الثاني يوجد اوربيتال واحد 
- في المستوى الثاني يوجد ثلاثة اوربيتالات 
- في المستوى الثاني يوجد خمسة اوربيتالات 
- في المستوى الثاني يوجد سبعة اوربيتالات 




يتسع اوربيتال الواحد لالكترونين فقط كحد اقصى ولكن قد يحتوي اوربيتال في بعض الاحيان على الكترون واحد او يكون فارغاً وعلى هذا الاساس فان المستويات الثانوية تتشعب كالاتي (اي تحتوي على الحد الاقصى من الالكترونات).

- المستوى الثاني  يتتشعب كحد اقصى 2 الكترون
- المستوى الثاني  يتتشعب كحد اقصى 6 الكترون
- المستوى الثاني  يتتشعب كحد اقصى 10 الكترون
- المستوى الثاني  يتتشعب كحد اقصى 14 الكترون

- تمرين (١ - ٣)**
- ما عدد الاوربيتالات في كل من مستوى الطاقة الرئيسية الاول والثالث؟
 - ما عدد الالكترونات في كل من مستوى الطاقة الرئيسية الثاني والثالث؟

ان من المفترض ان يتناقض الالكترونان في حال وجودهما في اوربيتال واحد لانهما يحملان نفس الشحنة السالبة، فهل فكرت لماذا لا تتناقض الالكترونات مع بعضها عند وجودها في نفس اوربيتال؟ للاجابة عن تساؤلك هذا ان كل الكترون يبرم حول محوره في نفس الوقت الذي يدور فيه حول النواة [الشكل (١ - ١٠) أ].

فعند ازدواج الالكترونين في اوربيتال واحد  فان احدهما سوف يبرم حول محوره باتجاه دوران عقرب الساعة ويعطى له الرمز اما الاخر فيكون برمه عكس دوران عقرب الساعة ويعطى له الرمز  اي ان احدهما سوف يبرم عكس الاخر مما يلقي تناقضهما [الشكل (١ - ١٠) ب].




- الشكل (١ - ١٠)**
- دوران الالكترون حول النواة.
 - دوران الالكترونين حول محوريهما في اوربيتال الواحد.

١ - ٥ الترتيب الالكتروني

تحتوي العناصر المختلفة على اعداد مختلفة من الالكترونات وتترتب هذه الالكترونات حول النواة في الذرة ويعرف ذلك بالترتيب الالكتروني لذلك تتصف ذرات كل عنصر بترتيب الكتروني خاص تتنظم فيه هذه الالكترونات في الذرة بحيث تكون الطاقة الكلية اقل ما يمكن وتراعي المبادئ والقواعد التالية عند ترتيب الالكترونات على المستويات.

١ - ٥ - ١ مبدأ أوفباو

ينص هذا المبدأ على ان مستويات الطاقة الثانوية تملأ بالالكترونات حسب تسلسل طاقاتها من الاوسط الى الاعلى وتتبع المنوال الموضح في الشكل (١ - ١١).



الشكل (١١ - ١)
تسلسل مستويات الطاقة
الثانوية.

وعند كتابة الترتيب الالكتروني لايّة ذرة يجب معرفة العدد الذري لتلك الذرة حيث أن عدد الالكترونات للذرة المتعادلة كهربائياً يكون مساوٍ لعددها الذري ويكتب عادة في اسفل يسار رمز العنصر. حيث يمتلئ اولاً اوربيتال 1s ثم 2s ثم 2p ثم 3s ثم 3p ثم 3d ثم 4s ثم 4p ثم 4d ثم 5s ثم 5p ثم 6s ثم 6p وهكذا

وكما يلي:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f

ونلاحظ انه كلما زاد رقم الغلاف الرئيسي (n) ازدادت طاقة الالكترونات الموجودة فيه وقلت المسافة بين غلاف رئيسي واخر لذلك يحصل تداخل بين الاغلفة الثانوية التي تعود لاغلفة رئيسية مختلفة. ويجب العلم ان الرقم المكتوب الى يسار رمز مستوى الطاقة الثانوي يمثل قيمة عدد الكم الرئيسي (n)، بينما يمثل العدد في اعلى يمين الرمز (s) الى عدد الالكترونات الموجودة في هذا المستوى .. وهكذا الحال لبقية الرموز وكما موضح في الشكل (1 - 12).

1 - 5 - 2 قاعدة هوند

وتنتص على انه لا يحدث ازدواج بين الكترونيين في مستوى الطاقة الثانوي الا بعد ان تشغله اوربيتالاته فراداً او لاً. تستخدم هذه القاعدة في حالة الذرات التي ينتهي ترتيبها الالكتروني بمستويات الطاقة الثانوية p و d و f حيث لا نضع الكترونيين في اوربيتال واحد الا بعد ان نضع الكتروناً واحداً في كل اوربيتال من اوربيتالات مستوى الطاقة الثانوية.

مثال 1 - 1 :

اكتب الترتيب الالكتروني لكل من المستويات الثانوية

الاتية: p^3 و d^4 و f^6 و p^4 و d^7 و f^{11} و p^5

الحل:

p^3

1	1	1
---	---	---

d^4

1	1	1	1	
---	---	---	---	--

f^6

1	1	1	1	1	1	
---	---	---	---	---	---	--

p^4

1	1	1	
---	---	---	--

d^7

1	1	1	1	1	1	
---	---	---	---	---	---	--


f^{11}

1	1	1	1	1	1	1	
---	---	---	---	---	---	---	--

p^5

1	1	1
---	---	---

عدد الالكترونات الموجودة في المستوى الثانوي (s)



الشكل (12 - 1)
طريقة كتابة الترتيب
الالكتروني.

تمرين (4 - 1)
بين كيفية ترتيب الالكترونات في اوربيتالات المستويات الثانوية التالية التي تحتوي على عدد من الالكترونات d^3, p^5, d^6, p^2

هل تعلم

لفهم قاعدة هوند افرض انك في صف يحتوى على رحلات تستوعب طالبين في كل رحلة ويطلب منك المدرس ان يجلس اولا طالبا في كل رحلة واذا بقي مزيداً من الطلاب عندها يجلس الطلاب الباقيين بالترتيب متراصين الى جانب زملائهم .

مثال 1 - 2 :

اكتب الترتيب الالكتروني للعناصر الآتية:



الحل :

العنصر	التوزيع الالكتروني
$_1\text{H}$	$1s^1$
$_2\text{He}$	$1s^2$
$_3\text{Li}$	$1s^2 \ 2s^1$
$_4\text{Be}$	$1s^2 \ 2s^2$


مثال 1 - 3 :

اكتب الترتيب الالكتروني وبين ترتيب الالكترونات في المستوى الرئيسي الاعلى طاقة لكل عنصر من العناصر الآتية:



الحل :

تمرين (1 - 5)
اكتب الترتيب الالكتروني ثم بين توزيع الالكترونات على الاوربيتالات في العناصر الآتية:




العنصر	الترتيب الالكتروني	مستوى الطاقة الرئيسي الاخير
$_5\text{B}$	$1s^2 \ 2s^2 \ 2p^1$	$2s^2 \ 2p^1$
$_8\text{O}$	$1s^2 \ 2s^2 \ 2p^4$	$2s^2 \ 2p^4$
$_{10}\text{Ne}$	$1s^2 \ 2s^2 \ 2p^6$	$2s^2 \ 2p^6$
$_{12}\text{Mg}$	$1s^2 \ 2s^2 \ 2p^6 \ 3s^2$	$3s^2$
$_{13}\text{Al}$	$1s^2 \ 2s^2 \ 2p^6 \ 3s^2 \ 3p^1$	$3s^2 \ 3p^1$
$_{15}\text{P}$	$1s^2 \ 2s^2 \ 2p^6 \ 3s^2 \ 3p^3$	$3s^2 \ 3p^3$

مثال ١ - ٤ :


اكتب الترتيب الالكتروني لذرة عنصر الصوديوم $_{11}\text{Na}$ مبيناً التدرج في الطاقة حسب مستويات الطاقة الرئيسية .

الحل:



تمرين (٦ - ١)



اكتب الترتيب الالكتروني لذرات العناصر الآتية ثم بين ترتيب مستويات الطاقة الرئيسية حسب تدرجها من الأقل إلى الأعلى .



مثال ١ - ٥ :


اكتب الترتيب الالكتروني لذرة الكلور $_{17}\text{Cl}$ ثم بين ترتيب مستويات الطاقة الثانوية حسب تدرجها في الطاقة من الأقل إلى الأعلى .

الحل:




تمرين (٧ - ١)

اكتب الترتيب الالكتروني لذرات العناصر الآتية ثم بين ترتيب مستويات الطاقة الثانوية حسب تدرجها من الأقل إلى الأعلى .



* ملاحظة : مطلوب من الطالب فقط معرفة العناصر التي يكون عددها الذري لا يتجاوز (٢٠) من الجدول الدوري لاستئلة هذا الفصل .

اذكر عدد الالكترونات في كل مستوى رئيسي من الطاقة حول نواة العنصر.




تمرين (8 - 1)
اذكر عدد الالكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي حول نوى العناصر ^2He , ^7N , ^5B

الحل:



المستوى الرئيسي الاول $n = 1$ يحتوي على 2 ألكترون
المستوى الرئيسي الثاني $n = 2$ يحتوي على 3 ألكترون



المستوى الرئيسي الاول $n = 1$ يحتوي على 2 ألكترون
المستوى الرئيسي الثاني $n = 2$ يحتوي على 8 ألكترون



المستوى الرئيسي الاول $n = 1$ يحتوي على 2 ألكترون
المستوى الرئيسي الثاني $n = 2$ يحتوي على 8 ألكترون
المستوى الرئيسي الثالث $n = 3$ يحتوي على 2 ألكترون

1 - 6 ترتيب لويس (رمز لويس)

يعتمد رمز لويس على عدد الالكترونات الموجودة في الغلاف الاخير (مستوى الطاقة الخارجي) والذي يدعى بغلاف التكافؤ. ترتيب الالكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي لذرة العنصر بطريقة صورية تسمى ترتيب (رمز) لويس وكما يأتي :

يكتب رمز العنصر الكيميائي محاطاً بنقاط تمثل كل نقطة الكتروناً واحداً وتمثل كل نقطتين متجاورتين زوجاً

الكترونية، ويتم توزيع هذه النقاط بحيث لا يزيد عددها في كل جهة من الجهات الأربع المحيطة بالرمز على نقطتين إلى يمين الرمز ونقطتين إلى يساره ونقطتين أعلى ونقطتين أسفله، وكما هو مبين أدناه. والشكل (1 - 13) يوضح ترتيب لويس لبعض العناصر في الجدول الدوري.



IA	IIA	IIIA	IIIA	VA	VIA	VIA	VIA	He
H								
Li	Be							
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	
K	Ca	Cr	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Ba	Sn	Se	Te	I	Xe	
Cs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	Akt	Rn	
Fr	Ra							

الشكل (1 - 13)
جزء من الجدول الدوري
موضحا فيه ترتيب لويس
لبعض العناصر.

مثال ١ - ٧

اكتب رمز لويس للعناصر الآتية :

$_{12}^{22}\text{Mg}$ ، $_{10}^{18}\text{Ne}$ ، $_{5}^{11}\text{B}$ ، $_{1}^{1}\text{H}$ ، $_{14}^{28}\text{Si}$

الحل :

أولاً نكتب الترتيب الالكتروني لكل عنصر لكي نحدد عدد الالكترونات في الغلاف الخارجي .

تسرين (1 - 9)

اكتب رمز لويس
للعناصر الآتية:

$_{20}^{40}\text{Ca}$ ، $_{18}^{36}\text{Ar}$ ، $_{13}^{27}\text{Al}$

العنصر	الترتيب الالكتروني	الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي	رمز لويس
$_{1}^{1}\text{H}$	$1s^1$	1	H•
$_{5}^{11}\text{B}$	$1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^1$	3	•B•
$_{10}^{18}\text{Ne}$	$1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6$	8	•Ne•
$_{12}^{22}\text{Mg}$	$1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6 \quad 3s^2$	2	•Mg•
$_{14}^{28}\text{Si}$	$1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6 \quad 3s^2 \quad 3p^2$	4	•Si•

مثال ١ - ٨ :

ذرة عنصر مرتبة فيها الالكترونات كالتالي: $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^4$

١ - ما عدد الالكترونات في هذه الذرة؟

٢ - ما العدد الذري للعنصر؟

٣ - ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟

٤ - ما عدد الالكترونات غير المزدوجة؟

٥ - اكتب رمز لويس لهذه الذرة؟

الحل:

١ - عدد الالكترونات فيها يساوي ٨.

٢ - العدد الذري للعنصر يساوي ٨ لأنَّه يساوي عدد الالكترونات.

٣ -

المستوى الثانوي $1s$ وكذلك المستوى الثانوي $2s$ مملوءة بالالكترونات أما المستوى $2p$ غير مملوء لذلك يكون عدد المستويات الثانوية المملوءة بالالكترونات اثنان فقط.

٤ -

نلاحظ عدد الالكترونات غير المزدوجة اثنان فقط.

٥ - رمز لويس للعنصر:

● ●

● ● العنصر

١ - ٧ الجدول الدوري

يعتبر الجدول الدوري أهم أداة لدارسي علم الكيمياء ومن بين فوائده المتعددة توقع وفهم خواص العناصر فمثلاً إذا علمت الخواص الفيزيائية والكيميائية لعنصر في زمرة أو دورة يمكنك التوقع إلى حد كبير وصحيح خواص العناصر التي تقع في زمرته أو دورته، [الشكل (١ - ١٤)].


١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
IA	IIA	IIIB	IVB	V B	VIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	IIIA	IVA	V A	VIA	VIIA	VIIIA

الشكل (١ - ١٤)

جزء من الجدول الدوري بدون عناصر.

١ - ٨ ترتيب العناصر في الجدول الدوري تبعاً لترتيبها الإلكتروني

تقوم الالكترونات بالدور الأكثر أهمية في تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للعنصر وخصوصاً الالكترونات الموجودة في مستويات الطاقة الخارجية التي نعرفها بالكترونات التكافؤ، ويعتمد ترتيب العناصر في الجدول الدوري على هذه الخواص. يمكن تقسيم العناصر إلى أربعة تجمعات تبعاً لنوع المستوى الثانوي الذي ينتهي به الترتيب الإلكتروني للعنصر (s و p و d و f) وكما موضحاً في الشكل (15 - 1).



الشكل (15 - 1)
تقسيم الجدول الدوري
حسب مستويات الطاقة
الثانوية التي ينتهي
بها الترتيب الإلكتروني
للعناصر.

١ - ٨ - ١ عناصر تجمع - s (بلوك s)

وهي العناصر التي تقع في أقصى يسار الجدول الدوري وتضم الزمرتين IA و IIA والتي ينتهي ترتيبها الإلكتروني بمستوى الطاقة الثنائي s عدا الهيليوم He حيث يوضع مع العناصر النبيلة في أقصى اليمين. وتضم الزمرة IA العناصر التي يحتوي مستوى طاقتها الثنائي الأخير من نوع s على الكترون واحد فقط أما الزمرة IIA فتضم العناصر التي يحتوي مستوى طاقتها الثنائي الأخير s على الالكترونين.

١ - ٨ - ٢ عناصر تجمع - p (بلوك p)

IA	IIA	III A	IV A	VA	VIA	VIIA	He
H	Li Be	B	C	N	O	F	Ne

الشكل (16 - 1) الجدول الدوري ممثلاً فيه العناصر الممثلة.

وهي العناصر التي تقع في يمين الجدول الدوري، لاحظ الشكل (16 - 1) والتي ينتهي ترتيبها الإلكتروني بالمستوى الثاني p وتشمل ستة زمر الخمسة الاولى منها هي IIIA و IVA و VA و VIIA (الزمرة VIIIIA أو الزمرة صفر) فتسمى بزمرة العناصر النبيلة. تسمى العناصر التي تكون مماثلة جزئياً بالاكترونات في الاغلفة الثانوية s و p وكذلك زمرة العناصر النبيلة بالعناصر المماثلة، كما وتطلق تسميات معينة أخرى على بعض زمر العناصر حيث تسمى عناصر الزمرة (IA) بالفلزات القلوية، أما عناصر الزمرة (IIA) فتسمى بفلزات الاربة القلوية وعناصر الزمرة (VIIA) بالهالوجينات.

* عناصر بلوك s *

1 IA	2 IIA
1 H	2 Be
3 Li	4 Mg
11 Na	12 Ca
19 K	20 Rb
37 Sr	38 Cs
55 Ba	56 Fr
87 Ra	88

عناصر بلوك d

3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIIB	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IIB
21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn
39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd
57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg
89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub

عناصر بلوك p

13 IIIA	14 IV A	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn

عناصر بلوك f

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

الشكل (17 - 1) الجدول الدوري للعناصر.

* يكتب العدد الذري للعنصر في الجدول الدوري في أعلى يسار رمز العنصر وهذا على عكس ما تعلمته عند كتابة العدد الذري للعنصر والذى يكون في أسفل يسار رمز العنصر وهنا للتوضيح فقط.

١ - ٨ - ٣ عناصر تجمع - d (بلوك d)

هي عناصر فلزية ينتهي الترتيب الإلكتروني لها بالمستويين الثانويين (s و d) ويطلق على هذه العناصر بالعناصر الانتقالية (Transition Elements) أو عناصر المجموعة B وتقع في وسط الجدول الدوري، كما موضحة في الشكل (1 - 17).

١ - ٨ - ٤ عناصر تجمع - f (بلوك f)

وهي العناصر المتجمعة في أسفل الجدول الدوري وينتهي ترتيبها الإلكتروني بالمستوى الثنائي f ويطلق عليها العناصر الانتقالية الداخلية (The inner-transition elements)، وتضم 14 عنصر وتنتهي إلى الدورتين السادسة والسابعة، [الشكل (1 - 17)].

هل تعلم

تستعمل العازات النبيلة في صناعة الاشارات المضيئة ولوحات الاعلان مثل لغاز النبؤون.

١ - ٩ كيفية معرفة الدورة والزمرة التي يقع فيها اي عنصر من عناصر المجموعة A

لمعرفة رقم الدورة والزمرة لعناصر المجموعة A نقوم بالخطوات الآتية:

اولاً: نكتب الترتيب الإلكتروني للعنصر.

ثانياً: يمثل رقم الدورة أعلى رقم للمستوى الرئيسي n الذي ينتهي به الترتيب الإلكتروني للعنصر.

ثالثاً: يمكن ايجاد رقم الزمرة كالتالي:

أ - اذا انتهى الترتيب الإلكتروني بالمستوى الثنائي s فعدد الالكترونات الموجودة في هذا المستوى يمثل رقم الزمرة.

ب - اذا انتهى ترتيبه الإلكتروني بالمستوى الثنائي p فعدد الالكترونات الموجودة في هذا المستوى بالإضافة الى الالكترونين الموجودين في المستوى الثنائي s ضمن المستوى الرئيسي الذي يتسبّع قبله يمثل رقم الزمرة.

اذا كان العدد 8 الالكترونات فيعني هذا ان العنصر يقع في الزمرة الثامنة او الزمرة صفر وهي زمرة العناصر النبيلة، عدا الهيليوم فان مستوى الطاقة الرئيسي الاخير له ينتهي بـ (2) الالكترون فقط.


ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل من العناصر الآتية:



هل تعلم

لم يفز مونتيليف بجائزة نوبل وذلك لأن عظمة عمله لم تعرف إلا عام 1906 اي قبل سنة واحدة من وفاته حيث رشح لنيل جائزة نوبل في الكيمياء لكنه خسر بفارق صوت واحد لمصلحة هنري موسان الذي اكتشف الفلور.

الحل:



آخر مستوى رئيسي هو الثاني 2 لذا فان دورته هي الثانية.

آخر مستوى ثانوي هو p يحتوي 4 كترونات فيضاف لها الكتروني s الذي تشعب قبله فيكون المجموع :

$$6 = 2 + 4 \quad \text{لذا فان زمرته هي السادسة.}$$

اذن الاوكسجين يقع ضمن الدورة الثانية في الزمرة السادسة من الجدول الدوري.



آخر مستوى رئيسي له المستوى الثالث 3 لذا فان دورته هي الثالثة. آخر مستوى ثانوي له p يحتوي 5 كترونات اضافة الى 2 كترون من مستوى 3s الذي قبله فيكون المجموع 7 لذا فان زمرته السابعة.


اذن الكلور يقع ضمن الدورة الثالثة في الزمرة السابعة من الجدول الدوري.



آخر مستوى رئيسي الثاني 2 لذا فان دورته هي الثانية.

واخر مستوى ثانوي له p يحتوي 6 كترونات 2 كترون من مستوى 2s الذي قبله فيكون المجموع 8 لذا فان زمرته هي الثامنة.

اذن النيون يقع ضمن الدورة الثانية في الزمرة صفر من الجدول الدوري.



آخر مستوى رئيسي له المستوى الرابع 4 لذا فان دورته هي الرابعة.

آخر مستوى ثانوي له s يحتوي الكترون واحد لذا فان زمرته هي الاولى.

اذن البوتاسيوم يقع ضمن الدورة الرابعة في الزمرة الاولى من الجدول الدوري.

مثال 1 - 10:

ما الشيء المشترك بين موقع العناصر التالية في الجدول




الحل:

^3Li	$1s^2$	$2s^1$	زمرة أولى دورة ثانية
^{11}Na	$1s^2$	$2s^2 2p^6$	زمرة أولى دورة ثالثة
^{12}Mg	$1s^2$	$2s^2 2p^6$	زمرة ثانية دورة ثالثة

اذن الذي يربط بين Li و Na انهم يشتركان في زمرة واحدة هي الزمرة الاولى اما الذي يربط بين Na و Mg انهم يشتركان في دورة واحدة هي الدورة الثالثة .

تمرين (11 - 1)

ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل من العناصر الآتية في الجدول الدوري:



مثال 1 - 11:

ما الشيء المشترك بين موقع العناصر التالية في الجدول




الحل:

^4Be	$1s^2$	$2s^2$	زمرة ثانية دورة ثانية
^5B	$1s^2$	$2s^2 2p^1$	زمرة ثالثة دورة ثانية
^7N	$1s^2$	$2s^2 2p^3$	زمرة خامسة دورة ثانية

تمرين (12 - 1)

ما الشيء المشترك بين موقع العناصر التالية في الجدول الدوري:




تشترك هذه العناصر في دورة واحدة وهي الدورة الثانية ولكنها تختلف في الزمر حيث ان كل عنصر من زمرة فعنصر البريليوم Be يقع في الزمرة الثانية وعنصر البورون B يقع في الزمرة الثالثة اما عنصر النتروجين N فيقع في الزمرة الخامسة.

1 - 10 الخواص الدورية

تدرج الخواص الفيزيائية والكيميائية للعناصر الموجودة في زمر دورات الجدول الدوري من حيث انصاف قطرها الذرية وطاقات تأينها والفتها الالكترونية وسالبيتها الكهربائية وكما مبين في ادناه.

1 - 10 - 1 نصف قطر الذرة

ان الذي يحدد حجم الذرة هو نصف قطرها ويتحدد نظرياً باخر مستوى مشغول بالالكترونات ان احدى الطرائق المستخدمة لقياس نصف القطر الذري هي قياس المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائياً ثم قسمة المسافة المقاسة على اثنين، وكما موضح في الشكل (18 - 1) ويمكن بذلك تعريف نصف القطر الذري على انه نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين متحدتين كيميائياً. ويلاحظ ان العناصر ضمن الدورة الواحدة يقل نصف قطرها كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين اي بزيادة اعدادها الذرية حيث تزداد قوة الجذب بين الالكترونات ضمن المستوى الرئيسي الواحد مع الشحنة الموجبة للنواة بزيادة عددها فيه. اما في الزمر فيزداد نصف القطر كلما اتجهنا من الاعلى الى الاسفل في الجدول وابتعاد الالكترونات الخارجية عن النواة، وكما مبين في الشكل (19 - 1).



الشكل (18 - 1)
كيفية ايجاد نصف قطر الذرة.

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII A
1	H							He
2	Li	B	C	N	O	F	Ne	He
3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Cr	Ti	As	Se	Br	Rb
5	Rb	Sr	Tl	Ge	Sb	Te	I	Fr
6	Cs	Ba	Fr	Sn	Pb	At	Rn	Ra


الشكل (19 - 1)
جزء من الجدول الدوري
موضحاً فيه حجم بعض
ذرات العناصر.

يقل الحجم الذري للدورة بالاتجاه من اليسار الى اليمين


يزداد الحجم الذري من اليسار الى اليمين

مثال 1 - 12 :

رتب العناصر التالية حسب زيادة انصاف اقطارها الذرية:



الحل:




نلاحظ ان جميع هذه العناصر تنتهي بالمستوى الرئيسي الثاني اي انها تقع ضمن الدورة الثانية من الجدول الدوري وعليه يكون ترتيب العناصر حسب زيادة انصاف اقطارها

كالاتي: ${}_{_3}^{\text{Li}} > {}_{_6}^{\text{C}} > {}_{_8}^{\text{O}} > {}_{_9}^{\text{F}}$

تمرين (13 - 1)

رتب العناصر الاتية حسب زيادة انصاف اقطارها الذرية:



1 - 10 - 2 طاقة التأين

تعرف طاقة التأين بانها مقدار الطاقة اللازمة لنزع الكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية كما في تأين ذرة الصوديوم



ذرة صوديوم في
الحالة الغازية



الشكل (20 - 1)
تدرج طاقات التأين لذرات بعض العناصر.

تتدرج طاقات التأين في الزمر من الاعلى الى الاسفل فكلما زاد العدد الذري كلما قلت طاقة التأين لهذا العنصر بسبب ابتعاد الكترونات الاغلفة الخارجية عن النواة مما يسهل فقدان احدهما اما في الدورات فان طاقات التأين تزداد للعناصر كلما زاد العدد الذري للعنصر بسبب زيادة الشحنة الموجبة ضمن النواة وبقاء الالكترونات في نفس مستوى الطاقة الرئيسي الخارجي فتزداد بذلك قوة الجذب على الالكترون من قبل الشحنات الموجبة للنواة [الشكل (1 - 20)]، وهناك استثناء لهذه الزيادة وهو انه اذا كان للذرة غلاف ثانوي مشبع مثل ns^2 او نصف مشبع مثل np^3 فتكون طاقة تأينها اكبر من طاقة تأين الذرة التي بعدها مثل N ، اكبر طاقة تأين من O على الرغم من ان ذرة الاوكسجين اكبر عدد ذري من ذرة النتروجين ويقعان في دورة واحدة. تمتلك العناصر النبيلة اعلى طاقة تأين لأنها لا تفقد الكتروناتها بسهولة.

1 - 10 - 3 الالفة الالكترونية Electron Affinity

تعرف الالفة الالكترونية بانها قابلية الذرة المتعادلة كهربائياً في الحالة الغازية على اكتساب الكترون واحد وتحرير مقداراً من الطاقة، كما في ذرة الفلور.



تزداد الالفة الالكترونية للعناصر في الدورات بزيادة العدد الذري لها اما في عناصر الزمرة الواحدة فتزداد صعوبة اضافة الالكترون بزيادة العدد الذري للعنصر فكلما زاد العدد الذري ازدادت صعوبة اضافة الالكترون. وتعتبر العناصر النبيلة اقل العناصر التي لها الالفة الكترونية لانه من الصعوبة اضافة الكترونات اليها.

هل تعلم

الكهرسلبية هي خاصية من خواص الذرات في المركبات بينما طاقة التأين والالفة الالكترونية هما خصائص الذرات بحالتها المفردة .

1 - 10 - 4 الكهرسلبية Electronegativity

في الكثير من المركبات تكون الشحنة السالبة للكترونات التأثير مرکزة بالقرب من ذرة معينة دون غيرها مما يؤثر بشكل كبير في الخواص الكيميائية للمركب وتعرف الكهرسلبية بانها قدرة الذرة على جذب الكترونات التأثير


نحوها في أي مركب كيميائي وبما ان الفلور اعلى العناصر كهرسلبية فقد تم اعطاءه الرقم 4 كقياس للكهرسلبية وحددت هذه القيم لباقي العناصر قياساً على كهرسلبية الفلور، [الشكل (1 - 21)].

تزداد الكهرسلبية كلما زاد العدد الذري في الدورة مع وجود بعض الاستثناءات اما في الزمر فتقل كلما زاد العدد الذري.

وبالنسبة للغازات النبيلة فتعتبر شاذة لأن بعضها لا يكون مركبات وبالتالي لا يمكن تعين الكهرسلبية له لكن عندما يكون الغاز النبيل مركبات فيكون ذا كهرسلبية عالية جداً.

هل تعلم

ان الفلزات اقل كهرسلبية من اللافلزات، كما ان الكهرسلبية مرتبطة بحجم الذرة فكلما صغر حجم الذرة ازدادت كهرسلبيتها اي ان الذرة الصغيرة تملك قوة جذب اكبر للكتروناتها وللكترونات الذرات الاخرى.




الشكل (21 - 1)
تدرج الكهرسلبية لذرات بعض العناصر.

١ - 10 - 5 الخواص الفلزية واللافلزية

تتغير الخواص الفلزية واللافلزية تبعاً للتغير العدد الذري لذرات الزمرة الواحدة أو لذرات الدورة الواحدة، فكلما زداد العدد الذري لذرات دورة واحدة تقل الخواص الفلزية لتظهر وتزداد الخواص اللافلزية. فمثلاً، في الدورة الثانية يظهر الليثيوم والبريليوم الخواص الفلزية ثم يأتي البورون بخواص أشباه الفلزات ثم تأتي بقية عناصر الدورة كالكاربون

والنتروجين والاكسجين والفلور حيث تظهر الخواص اللافلزية. أما في الزمرة الواحدة فكلما ازداد العدد الذري للعناصر تزداد الخواص الفلزية وتقل الخواص اللافلزية. تكون جميع عناصر الزمرتين الاولى IA ، والثانية IIA فلزات بينما تكون اغلب عناصر الزمرتين السادسة VIA والسابعة VIIA لافلزات. أما بقية الزمر فلا تكون جميع العناصر فيها من صنف واحد. فمثلاً في الزمرة



الشكل (22-1)
الجدول الدوري موضحاً فيه
ترتيب الفلزات واللافلزات.

الخامسة يظهر النتروجين خواصاً لا فلزية بينما يسلك الزرنيخ والانتيمون سلوك أشباه الفلزات ويأتي البزمون وهو آخر عنصر في الزمرة الخامسة بصفات فلزية. أما بالنسبة للدورة فعنصراً الدورة الأولى وهما الهيدروجين والهيليوم لا فلزان أما في الدورات الأربع التي بعدها فيكون هناك انتقال تدريجي من الخواص الفلزية إلى الخواص اللافلزية، أما في الدورة السادسة فجميع عناصرها من الفلزات عدا عنصر الاستاتين من أشباه الفلزات وعنصر الرادون لا فلز بينما لا تحتوي الدورة السابعة إلا على الفلزات مع العلم بأن العناصر الانتقالية، وعناصر اللانثنيات وعناصر الاكتينيات (التي هي عناصر انتقالية داخلية) تظهر الخواص الفلزية.

أسئلة الفصل الأول

- 6 - مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يحتوي على عدد من الاوربيتالات مقداره:
- أ - 4 اوربيتال.
 - ب - 9 اوربيتال.
 - ج - 16 اوربيتال.
- 7 - لذرة عنصر ترتيب الكتروني حسب تدرج مستويات الطاقة الثانوية كالتالي:
- $$2s^2 \quad 2p^3 \quad 1s^2$$
- لذا فان العدد الذري للعنصر مقداره:
- أ - 5
 - ب - 4
 - ج - 7
- 8 - الترتيب الالكتروني لذرة النيون $_{10}Ne$ كالتالي:
- (أ) $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6$
 - (ب) $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6 \quad 3s^1$
 - (ج) $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^4 \quad 3s^2$
- 9 - في الجدول الدوري عناصر بلوك d تقع:
- أ - اسفل الجدول الدوري.
 - ب - يمين الجدول الدوري.
 - ج - وسط الجدول الدوري.
- 10 - في الجدول الدوري العناصر التي تتجمع يمين الجدول الدوري هي:
- أ - عناصر بلوك p
 - ب - عناصر بلوك f
 - ج - عناصر بلوك s
- 11 - الهالوجينات هي عناصر الزمرة:
- أ - IA
 - ب - VIIA
 - ج - VIIIIA

- 1.1 اختر ما يناسب التعابير الآتية:
- 1 - الالكترون الاكثر استقراراً هو الالكترون الموجود في :
- أ - مستوى الطاقة الرئيسي الرابع.
 - ب - مستوى الطاقة الرئيسي الثالث.
 - ج - مستوى الطاقة الرئيسي الثاني.
- 2 - مستوى الطاقة الرئيسي الذي يستوعب على اكثرب من الالكترونات من المستويات الآتية هو:
- أ - مستوى الطاقة الرئيسي الاول.
 - ب - مستوى الطاقة الرئيسي الثاني.
 - ج - مستوى الطاقة الرئيسي الثالث.
- 3 - مستوى الطاقة الرئيسي الثاني ($n=2$) يحتوي على اقصى عدد من الالكترونات مقداره:
- أ - 32 الكترون.
 - ب - 18 الكترون.
 - ج - 8 الكترون.
- 4 - مستوى الطاقة الثانوي f يحتوي على عدد من الاوربيتالات مقداره:
- أ - 3 اوربيتال.
 - ب - 7 اوربيتال.
 - ج - 5 اوربيتال.
- 5 - في مستوى الطاقة الثانوي d ست الالكترونات يمكن ترتيبها حسب قاعدة هوند كالتالي:
- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- أ -
 - ب -
 - ج -

أسئلة الفصل الأول

17 - عنصر يقع في الزمرة الخامسة والدورة الثالثة فان مستوى الطاقة الثانيي الاخير له هو :

- أ - $3p^5$
- ب - $5p^3$
- ج - $3p^3$

18 - العنصر الذي له اعلى كهرسلبية من بين جميع العناصر الاتية :


- أ - الفلور.
- ب - الكلور.
- ج - البروم.

19 - يزداد نصف قطر العناصر ضمن الدورة الواحدة:

- أ - كلما قل عددها الذري.
- ب - كلما زاد عددها الذري.

ج - كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين في الدورة الواحدة في الجدول الدوري.

20 - ترتيب لويس لعنصر الاركون Ar_{18} هو:



2.1 اذكر تصور نموذج رذرفورد للبناء الذري ثم بين لماذا فشل هذا التصور.

12 - ذرة عنصر ينتهي ترتيب الكتروناتها بالمستوى $3p^3$ وبذلك يكون ترتيب مستوياتها الثانوية كالتالي:

- أ - $1s^2 \quad 2p^6 \quad 3p^3$
- ب - $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6 \quad 3s^2 \quad 3p^3$
- ج - $1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6 \quad 3p^3$

13 - ينسب اكتشاف نواة العنصر للعالم :

- أ - رذرфорد.
- ب - بور.
- ج - ثومسون.

14 - ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى $3s^1$ فالعدد الذري لهذا العنصر هو:

- أ - 8
- ب - 13
- ج - 11

15 - الطاقة اللازمة لنزع الالكترون من ذرة معينة تسمى:

- أ - الميل الالكتروني.
- ب - طاقة التأين.
- ج - الكهرسلبية.

16 - ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى الثانيي $2p^5$ لذا فانه يقع في الزمرة والدورة:

- أ - الزمرة الخامسة ، الدورة الثانية.
- ب - الزمرة الثانية، الدورة الخامسة.
- ج - الزمرة السابعة، الدورة الثانية.

أسئلة الفصل الأول

8.1 ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل عنصر من العناصر الآتية :



9.1 اكتب رمز لويس لكل من :



10.1 اي العناصر تسمى غازات نبيلة في الجدول الدوري وما اهم خاصية تتميز بها هذه العناصر.

11.1 كيف تم ترتيب بلوكتات العناصر في الجدول الدوري وبين موقعها.

12.1 ما عدد المستويات الثانوية والأوربيتالات والالكترونات التي يحتويها كل مستوى رئيسي من الطاقة (الثاني، الثالث).



1- اكتب الترتيب الالكتروني لكل عنصر.
2- رمز لويس لكل منها.

3 - تدرج مستويات الطاقة الثانوية والرئيسية لكل ذرة.

4 - عدد الالكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي حول نواة كل ذرة.

5 - عدد الالكترونات غير المزدوجة لكل ذرة.

6 - عدد مستويات الطاقة الثانوية الممولة بالالكترونات لكل ذرة.

7- دورة وزمراة كل ذرة وبين الشيء المشترك بينهما.


14.1 كيف تدرج الخواص الفلزية واللافلزية في (الدورة الثانية، الزمرة الخامسة).

3.1 اكتب بايجاز عن ما يأتي:
1- طاقة التأين.

2 - عدم حصول التنافر الالكتروني للكتروني الاوربيتال الواحد.

3 - نموذج ثومسون للذرة.

4 - مستويات الطاقة الثانوية.
5 - الكهرسلبية.



1 - اكتب الترتيب الالكتروني لهما مبيناً تدرج مستويات الطاقة الثانوية.

2- دورة وزمراة كل منها.

3- ما الشيء المشترك بين هذين العنصرين في موقعهما في الجدول الدوري.

4 - ترتيب لويس لكلاً منها.

5.1 الترتيب الالكتروني لعنصر الفلور




1 - ما العدد الذري للفلور.

2 - ما عدد مستويات الطاقة الثانوية الممولة بالالكترونات وما هي.

3 - عدد الالكترونات غير المزدوجة في ذرة الفلور.

6.1 رتب العناصر حسب نقصان حجمها الذري : ^{18}Ar و ^{10}Ne و ^{2}He

7.1 ما الشيء المشترك بين العناصر الآتية:



الفصل الثاني

2

الزمرتان الاولى والثانية

Groups IA and IIA



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان :

- يعرف أسماء ورموز عناصر الزمرتين الاولى IA والثانية IIA .
- يحدد السبب الذي تم بموجبه وضع هذه العناصر في زمرتين متجاورتين.
- يعين موقع كل زمرة منها في الجدول الدوري.
- يميز بين العناصر من حيث التدرج في الخواص.
- يتعرف على عنصر الصوديوم وبعض مركباته.
- يتعرف على عنصر الكالسيوم وبعض مركباته.
- يتمكن من تشخيص بعض العناصر في الزمرتين بطريقة كشف اللهب.
- يستنتج السبب في عدم وجود عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة.

2 - 1 : عناصر الزمرتين IA و IIA

تحتل عناصر الزمرتين الاولى والثانية الطرف اليسير من الجدول الدوري والشكل (2 - 1) يوضح موقعهما، وتضم عناصر الزمرة الاولى IA (الفلزات القلوية) الليثيوم (Li) و الصوديوم (Na) و البوتاسيوم (K) و الربيديوم (Rb) و السيزيوم (Cs) والفرانسيوم (Fr) وهذا الاخير هو الفلز الوحيد في هذه الزمرة الذي يحضر صناعياً.

اما عناصر الزمرة الثانية IIA (فلزات الارتية القلوية) فتضم البريليوم (Be) والمغنيسيوم (Mg) والكالسيوم (Ca) والسترونتيوم (Sr) والبارديوم (Ba) والراديوم (Ra) وهي مرتبة حسب زيادة اعدادها الذرية.

1 IA	2 IIA																	18 VIIIA
1 H	2 Be																	2 He
3 Li	4 Mg	3 IIIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIIB	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA	
11 Na	12 Mg	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	B	C	N	O	F	Ne	
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub							
58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu					
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr					



(1 - 2) موقع الزمرتين الاولى والثانية في الجدول الدوري.

2 - 2 الصفات العامة لعناصر الزمرتين IA و IIA

1 - عناصر هاتين الزمرتين ذات كهرسلبية واطئة وطاقة تأين واطئة.

2 - لجميع عناصر الزمرتين غلاف خارجي يحتوي على الكترون واحد بالنسبة لعناصر الزمرة الاولى (IA) و على الكترونين بالنسبة لعناصر الزمرة الثانية (IIA).

3 - لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة لشدة فعاليتها.

هل تعلم


ان الحجر الكريم الزمرد يتكون من عنصر البريليوم Be مضافاً اليه قليل من الكروم الاخضر.



(أ)



(ب)



(ج)

اًلا ان هناك اختلافاً بسيطاً في الصفات العامة بين الزمرتين الاولى والثانية حيث ان عناصر الزمرة الثانية تكون اقل فلزية من عناصر الزمرة الاولى كما ان طاقة تأين عناصر الزمرة الثانية اعلى من نظيرتها عن عناصر الزمرة الاولى بسبب نقصان الحجم الذري.

ومن اهم الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرتين IA و IIA

1- تتناقص درجات الانصهار ودرجات الغليان مع تزايد الاعداد الذرية لعناصر الزمرتين.

2- إن مركبات هذه الفلزات مثل الكلوريدات NaCl و KCl و إلخ تلون لهب مصباح بنزن بألوان مميزة لكل فلز حيث يلونه الليثيوم بلون قرمزي و مركبات الصوديوم بلون أصفر براق (ذهبى) وكذلك الحال مع بقية فلزات الزمرة الثانية مثل الكالسيوم الذي يلون اللهب بلون احمر طابوقي والسترونتيوم باللون القرمزي والباريوم باللون الاخضر المصفر وهكذا.

3- كثافة العناصر غير منتظمة الزيادة أو النقصان مع تزايد اعدادها الذرية . علماً ان كثافة العناصر الثلاثة الاولى (Li و Na و K) أقل من كثافة الماء بدرجة(25°C).



(K) بوتاسيوم



(Na) صوديوم



(Li) ليثيوم

عناصر الزمرة الاولى



(Rb) ريبيديوم



(Cs) سيزيوم



مغنيسيوم (Mg)



بريليوم (Be)



سترونتيوم (Sr)



كالسيوم (Ca)



راديوم (Ra)



باريوم (Ba)


بعض الخواص الكيميائية:

عناصر الزمرة الثانية

- 1 - لعناصر الزمرة الاولى (IA) الكترون واحد ولعناصر الزمرة الثانية (IIA) الكترونين في غلافهما الخارجي تستطيع ان تفقدها عند الدخول في تفاعل كيميائي وتكوين ايونات موجبة الشحنة (M^+) بالنسبة لعناصر الزمرة الاولى او ثنائية الشحنة (M^{2+}) بالنسبة لعناصر الزمرة الثانية.
- 2 - تتحد مع الالافلزات وتعطي املاماً مستقرة كثيرة الذوبان في الماء عدا الليثيوم الذي يكون اقل ذوبانية وذلك لصغر حجمه وقوه الجذب الكبيرة للنواة على الكتروناته.
- 3 - تسلك هذه العناصر سلوك عوامل مختزلة قوية (اي انها تميل لفقدان الكترونات التكافؤ الخارجية بسهولة اي لسهولة تأكسدها). وقد سميت عناصر الزمرة الاولى بالفلزات القلوية لأن محليلاتها عالية القاعدية. كما سميت عناصر الزمرة الثانية بفلزات الاربة القلوية لأن بعض اكاسيدها عرفت بالاربة القلوية.

هل تعلم

المحلول الذي ينتج عن تفاعل الفلز مع الماء هو محلول قاعدي (قلوي).



Sodium

2 - 3 الصوديوم

الرمز الكيميائي : Na

العدد الذري : 11

عدد الكتلة : 23

رسم الترتيب الالكتروني
لذرة الصوديوم.

الترتيب الالكتروني

رقم الغلاف(n)	عدد الالكترونات	رمز الغلاف
1	2	K
2	8	L
3	1	M



صوديوم محفوظ في النفط
الابيض.

2 - 3 - 1 وجوده

لا يوجد الصوديوم حراً في الطبيعة لشدة فعاليته بل يوجد متحداً مع غيره من العناصر مكوناً مركبات ثابتة ومنها كلوريد الصوديوم وكبريتاته وسليكاته وغيرها ويحفظ في سوائل لا يتفاعل معها مثل البنزين النقي والكيروسين (النفط الابيض) لكونه يشتعل عند تعرضه للهواء.

2 - 3 - 2 خواص عنصر الصوديوم

أ - الخواص الفيزيائية

فلز لين وله بريق فضي اذا قطع حديثاً كثافته اقل من كثافة الماء، وينصهر بدرجة (97.81 °C). ويغلي منصهر الصوديوم بدرجة (882.9 °C).



المقطع الحديث للصوديوم..
براق.

ب - الخواص الكيميائية


الصوديوم الحر عنصر فعال جداً يتعدى مباشرة مع معظم الالفلزات لتكوين مركبات ايونية، حيث يكون ايون الصوديوم الموجب (Na⁺). واهم خواصه الكيميائية:

1 - يتحد مباشرة مع أوكسجين الجو. فعند تعريض قطعة من الصوديوم (مقطوعة حديثاً) للهواء الرطب، يزول بريقها بعد فترة قصيرة وتكتسي بطبقة بيضاء.


2 - يتحد مع غاز الكلور مباشرةً ويتشتعل اذا سخن معه:




3 - يتفاعل بشدة مع الماء مكوناً هيدروكسيد الصوديوم ومحرراً غاز الهيدروجين .



4 - يتفاعل بشدة مع الحوامض المخففة مكوناً ملح الحامض ومحرراً غاز الهيدروجين:



5 - يتفاعل الصوديوم مع كثير من الاكاسيد والكلوريدات كما في المعادلتين الآتتين:



تفاعل الصوديوم مع الماء.

2 - 3 - 3 - استعمالات الصوديوم :

1 - يستعمل كعامل مختزل قوي في بعض التفاعلات العضوية لشدة وسرعة تأكسده.

2 - يستعمل في انتاج سيانيد الصوديوم المستخدم في تنقية الذهب وله استعمالات صناعية عديدة اخرى.

3 - يستخدم الصوديوم في عمليات التعدين للتخلص من اوكسجين الهواء المتحد مع الفلزات او الذائب في منصهراتها.



2 - 3 - 4 الكشف عن ايون الصوديوم في مركباته :

نستعمل كشف اللهب (الكشف الجاف) كما مر ذكره في خواص عناصر الزمرة الاولى التي ينتمي اليها عنصر الصوديوم حيث يلون الصوديوم اللهب باللون الاصفر.


2 - 3 - 5 بعض مركبات الصوديوم :

يلون الصوديوم اللهب بلون اصفر.

إن مركبات الصوديوم واسعة الإنتشار في الطبيعة أهمها الصخور الملحية (كلوريد الصوديوم) أو خليط من أملاح مزدوجة و بتأثير عوامل التعرية الجوية مثل مياه الأمطار و الهواء الذي يحتوي غاز ثنائي أوكسيد الكربون CO_2 يتتحول قسم من هذه الأملاح إلى كarbonات الصوديوم و الطين النقي (الصلصال) و الرمل.

أولاً: كلوريد الصوديوم

ملح الطعام النقي (كلوريد الصوديوم) NaCl أكثر مركبات الصوديوم إنتشاراً في الطبيعة فهو يوجد بشكل صخور ملحية في كثير من البلدان أو بشكل ترسبات ملحية تحت سطح الأرض و يوجد بكميات هائلة في مياه البحار و البحيرات و الينابيع.



بلورة كلوريد الصوديوم.

أ - استخراجه:



إذا كان الملح موجوداً تحت سطح الأرض بشكل تربات ملحية، فيستخرج بحفر آبار يضخ إليها الماء. ثم يسحب المحلول الناتج بواسطة مضخات ماصة إلى سطح الأرض. ويبخر الماء فتختلف بلورات الملح ثم ينقى.

أما إذا وجد الملح بنسبة عالية في مياه البحر فتضخ هذه المياه إلى أحواض واسعة ضحلة ثم يبخر الماء بحرارة الشمس و هذه هي الطريقة المستخدمة الآن في جنوب العراق (ملحات الفاو). و ملح الطعام المستخرج بالطرائق السابقة لا يكون نقياً . لذلك تتبع طرائق خاصة لتنقيته من الشوائب.

ب - استعمالات كلوريد الصوديوم

تجمع الاملاح في الطبيعة.



ملح الطعام مادة ضرورية للإنسان لا يمكنه الإستغناء عنها في غذائه اليومي. كما ان لها أهمية صناعية كبرى فهي:-
1- المادة الرئيسية المستعملة في تحضير العديد من مرകبات الصوديوم مثل كاربونات الصوديوم (صودا الغسيل) المستخدمة في صناعة الورق و الزجاج و في صناعة خميرة الخبز.

2 - يستعمل كلوريد الصوديوم في تحضير هيدروكسيد الصوديوم المستعمل في صناعة الصابون و الورق وفي تصفية النفط الخام.

3 - يستخدم كلوريد الصوديوم في تحضير غاز الكلور المهم صناعياً.

4 - يستفاد من كلوريد الصوديوم في حفظ المواد الغذائية صالحة للإستهلاك البشري لمدة من الزمن مثل اللحوم والأسماك. إذ ان محلوله المركز يقتل البكتيريا التي تسبب التعفن.

5 - يستعمل كلوريد الصوديوم في دباغة الجلد وعمليات صناعة الثلج للتبريد وفي تثبيت الأصباغ.

ج - خواص كلوريد الصوديوم

يمكن استنتاج بعض خواص كلوريد الصوديوم من اجراء التجربة الآتية:

ملح الطعام.

هل تعلم

ان NaCl هو مركب ايوني ولا يصح ان يسمى جزيء NaCl لانه يمثل ابسط نسبة عدديّة للايونات الموجبة والسلبية (ايونات العنصرتين) في البلورة وليس عدد الذرات.

تمرين (2 - 1)

ما الفرق بين كلوريد الصوديوم النقي والسكر من حيث تأثيرهما بالحرارة.

ضع بلورات من كلوريد الصوديوم النقي في زجاجة ساعة وضع في زجاجة ساعة أخرى؛ كمية من ملح الطعام العادي. واترك الزجاجتين في جو رطب (مع تأشير كل منهما). وبعد مرور يوم - او يومين - افحص الملح في كلتا الزجاجتين تلاحظ:

- ترطب الملح العادي وعدم تأثر الملح النقي - مما يدل على ان كلوريد الصوديوم مادة لا تمتص الماء من الجو (لا تتميء) وان خاصية امتصاص الماء (الرطوبة) من الجو؛ تقتصر على الملح العادي وتسمى ظاهرة امتصاص الرطوبة من الجو والتحول الى مادة مبتلة بـ (التميؤ). فملح الطعام العادي اذن مادة متميئة

ان سبب تميؤه يعزى الى احتواه على شوائب من كلوريد الكالسيوم او كلوريد المغذنيسيوم (او كليهما) وهاتان المادتان تميلان لامتصاص الرطوبة من الجو (تتميئان في الجو الرطب). اذن ما الفرق بين كلوريد الصوديوم النقي وملح الطعام العادي؟ ولماذا؟



هيدروكسيد الصوديوم.

ثانياً: هيدروكسيد الصوديوم NaOH


هيدروكسيد الصوديوم مادة صلبة تتميء عند تعرضها للهواء الرطب. وبتفاعل الطبقة المتميئة منه مع غاز ثنائي اوكسيد الكاربون في الجو؛ تتكون طبقة من كarbonات الصوديوم Na_2CO_3 لا تذوب في محلول NaOH المركز في المنطقة المتميئة. لذلك تشكل قشرة جافة على سطح حبيبات هيدروكسيد الصوديوم



وهيدروكسيد الصوديوم قاعدة كثيرة الذوبان في الماء تستعمل في مجالات صناعية عديدة منها صناعة الصابون والمنظفات (مساحيق وسوائل) وفي صناعات الانسجة والورق وكمامات اولية في تحضير العديد من المركبات المستعملة في الصناعة.

2 - 4 الكالسيوم

الرمز الكيميائي Ca
العدد الذري 20
عدد الكتلة 40



الترتيب الإلكتروني

رقم الغلاف(n)	رمز الغلاف	عدد الالكترونات
1	K	2
2	L	8
3	M	8
4	N	2

رسم الترتيب الإلكتروني لذرة الكالسيوم.

4 - 1 وجوده

لا يوجد فلز الكالسيوم بصورة حرة في الطبيعة لشدة فعاليته ويوجد متحداً مع غيره من العناصر على شكل كاربونات مثل المرمر وحجر الكلس وعلى شكل كبريتات مثل الجبس او على شكل فوسفات مثل فوسفات الكالسيوم او على شكل سليكات. ويستخلص الفلز بالتحليل الكهربائي لمناصر كلوريدي وفلوريدي الكالسيوم.



أغذية تحتوي على الكالسيوم.



خامات الكالسيوم في الطبيعة.

٤ - ٢ بعض مركبات الكالسيوم:




هيدروكسيد الكالسيوم.

١- هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca}(\text{OH})_2$

يحضر باضافة الماء الى اوكسيد الكالسيوم CaO (النورة او الجير الحبي) في عملية تعرف باطفاء الجير والتي تؤدي الى الحصول على هيدروكسيد الكالسيوم الذي يعرف احياناً بالجير المطفأ ويدعى محلول هيدروكسيد الكالسيوم الصافي بماء الكلس الصافي كما تصفه المعادلة الاتية:



الذي عند امرار غاز CO_2 عليه نلاحظ تعكره بسبب تكون كarbonات الكالسيوم. كما في المعادلة الاتية:



هل تعلم

ان استمرار امرار غاز CO_2 في محلول ماء الكلس الصافي - بعد تعكره - يسبب عودة محلول صافيًا!! وذلك لتكون $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ كثيرة الذوبان في الماء.

٢- كبريتات الكالسيوم :

توجد بشكل جبس $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ حيث يرتبط مع كبريتات الكالسيوم الصلبة جزيئين من الماء يسمى ماء التبلور وعندما يفقد ماء التبلور بالتسخين جزئياً يتحول الجبس الى جبس باريسب $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ والتفاعل انعكس اي عندما تلتقط عجينة باريسب الماء تتجمد وتتحول الى الجبس مع تمدد في الحجم . و تستعمل عجينة باريسب (جبس باريسب) في التجبير وفي صنع التماشيل وكذلك في البناء.



أسئلة الفصل الثاني

3.2 بين لماذا؟

- 1 - لا ينتمي الالمنيوم Al_{13} الى مجموعة عناصر الزمرة الاولى.
- 2 - عند ترك حبيبات $NaOH$ في الجو الرطب تتميء اولاً ثم تتكون عليها قشرة صلبة.
- 3 - يحفظ الصوديوم Na في النفط.
- 4 - سميت عناصر الزمرة الاولى بالفلزات القلوية.
- 5 - اختفاء لمعان قطعة الصوديوم المقطوعة حديثاً بعد فترة.

4.2 وضع علمياً لماذا:

- أ - سهولة انتزاع الكتروني التكافؤ من عنصر الكالسيوم.
- ب - وضع العناصر : الليثيوم Li والصوديوم Na_{11} والبوتاسيوم K_{19} ضمن زمرة واحدة رغم اختلافها في العدد الذري.
- ما الفرق بين كلوريد الصوديوم النقي $NaCl$ وبين $NaCl$ غير النقي.

1.2 اختر من بين القوسين ما يكمل المعنى العلمي فيما يأتي:

- 1 - من عناصر الزمرة الاولى : (الهيليوم ، الراديوم ، الصوديوم ، البورون)
- 2 - عنصر البوتاسيوم اكثر فعالية من عنصر الليثيوم وذلك : (لوجود الكتروني تكافؤ بذرته ، لأن نصف قطر ذرته اكبر ، لعدم وجود الكترون تكافؤ بذرته ، لوجوده حرراً في الطبيعة).
- 3 - تكافؤ عنصر المغنيسيوم في مركباته: (4 ، 3 ، 2 ، 1).

- 4 - اذا فقدت ذرة الليثيوم الكترون التكافؤ تتحول الى (ايون احادي الشحنة الموجبة ، ايون سالب ، ايون ثنائي الشحنة الموجبة ، ايون ثنائي الشحنة السالبة).

2.2 أ - اذكر الفرق بين الجبس الاعتيادي وجبس باريس.


- ب - لكلوريد الصوديوم اهمية صناعية كبرى. لماذا؟ اذكر ثلاث فوائد له.
- ج - الباريوم اكثر فلزية من البريليوم . علام استندنا في ذلك؟

الفصل الثالث

3

الزمرة الثالثة

Group IIIA



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على ان :

- يتعرف على أسماء ورموز عناصر الزمرة الثالثة.
- يحدد الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة.
- يفهم ان عنصر الالمنيوم لا يوجد حراً في الطبيعة.
- يستوعب الرمز والعدد الذري وعدد الكتلة لعنصر الالمنيوم.
- يدرك اهمية وفوائد الالمنيوم الفيزيائية ما يمكنه من مقارنته مع الحديد.
- يكشف - عملياً - عن ايون الالمنيوم في المحاليل المائية لمركباته.
- يتعرف على بعض مركبات الالمنيوم.

الزمرة الثالثة

³ B	بوروون
¹³ Al	الميريوم
³¹ Ga	كاليلوم
⁴⁹ In	انديوم
⁸¹ Tl	ثاليلوم

فلزات }

ان السبب في وضع عناصر هذه الزمرة في مجموعة واحدة، هو العامل نفسه الذي مر معنا في الزمرتين الاولى والثانية وهو احتواء الغلاف الخارجي لذراتها على ثلاثة الكترونات رغم اختلافها بالأعداد الذرية وعناصر هذه الزمرة هي: البوروون B والالميريوم Al والكاليلوم Ga والانديوم In والثاليلوم Tl، ويوضح الشكل (3 - 1) موقع هذه الزمرة في الجدول الدوري.

1 IA H	2 IIA Be	3 Na	4 Mg	5 Mn	6 Fe	7 Co	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IIB	13 III A Al	14 IV A Si	15 VA P	16 VIA S	17 VIIA Cl	18 VIIIA Ar	
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Nb	26 Mo	27 Ru	28 Rh	29 Pd	30 Ag	31 Cd	32 In	33 Ge	34 As	35 Se	36 Br	37 Kr
38 Rb	39 Sr	40 Y	41 Zr	42 Nb	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe		
55 Cs	56 Ba	57 La	58 Hf	59 Ta	60 W	61 Re	62 Os	63 Ir	64 Pt	65 Au	66 Hg	67 Tl	68 Pb	69 Bi	70 Po	71 At	72 Rn	
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub							

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Ir

الشكل (3 - 1)
موقع عناصر الزمرة الثالثة
في الجدول الدوري.

3 - 2 الصفات العامة لعناصر الزمرة الثالثة (IIIA)

- ان عناصر هذه الزمرة فلزات عدا البوروون شبه فلز.
- طاقة التأين لهذه العناصر اقل من طاقة تأين عناصر المجموعة الثانية، وذلك لأن عناصر هذه الزمرة تحتوي على الكترون واحد في الغلاف الثنائي p بعد غلاف ثانوي مشبع (سواء اكان s او p) اما عناصر الزمرة الثانية فيكون غلافها الخارجي هو الغلاف الثنائي المشبع ns².

هل تعلم

ان هيدروكسيد البوروون صيغته $B(OH)_3$ لكننا نعرفه ايضا باسم حامض البوريك وصيغته من H_3BO_3 يمكن كتابتها بهذه الصادرة استعمالات طبية عديدة ومفيدة.


وبازدياد العدد الذري لعناصر هذه الزمرة (من الاعلى نحو الاسفل) يحصل نقصان طاقة تأين ذراتها بصورة عامة (بسبب كبر حجمها الذري).

3- من ملاحظة عدد الكترونات الغلاف الخارجي لذرات عناصر هذه الزمرة، تتوقع بأن الحالة التأكسدية لذراتها هي (+3) بالإضافة إلى حالات تأكسدية أخرى.


4- تتميز خواص أكسيد وهيدروكسيدات عناصر هذه الزمرة بزيادة الصفة القاعدية ونقصان الصفة الحامضية كلما زاد العدد الذري . حيث نجد المحاليل العائمة لأكسيد البورون حامضية، بينما تكون أكسيد الالمنيوم امفوتييرية، أما أكسيد عناصر بقية افراد هذه الزمرة فتكون قاعدية.

تمرين (3 - 1)

قارن بين طاقتى التاثين لعنصر من الزمرة الثالثة مع عنصر المجاور له (إلى يساره) من الزمرة الثانية.



(B) بورون



(Al) المنيوم



(K) كالسيوم



(In) انتيميوم

نماذج من عناصر الزمرة الثالثة.

Aluminum


3 - 3 : الالمنيوم

الرمز الكيميائي: Al

العدد الذري: 13

عدد الكتلة: 27

الترتيب الإلكتروني



رسم الترتيب الإلكتروني
لذرة الالمنيوم.

رقم الغلاف (n)	رمز الغلاف	عدد الالكترونات
1	K	2
2	L	8
3	M	3

3 - 3 - 1 وجود الالمنيوم

لا يوجد الالمنيوم حرّاً في الطبيعة لأنّه من الفلزات الفعالة فهو يوجد متحداً مع غيره من العناصر ضمن مركبات متنوعة. والالمنيوم أوسع الفلزات انتشاراً في قشرة الأرض، فهو يلي الاوكسجين (46%) و السيليكون (28%) في سعة انتشاره. إذ يُؤلف الالمنيوم نحو (8%) من صخور القشرة الأرضية والطين، ورغم انتشار ساليكارات الالمنيوم المعقّدة في الصخور والطين، فإنّها لا تصلح لاستخلاص الالمنيوم منها، حالياً، بسبب الكلفة العالية اقتصادياً. يعتبر البوكسايت $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ وهو اوكسيد الالمنيوم المائي، الخام الرئيسي للالمنيوم، فهو أهم خام يستعمل لاستخلاص الفلز. بينما يعتبر الكريوليت $(\text{Na}_3\text{AlF}_6)$ وهو فلوريد مزدوج من الصوديوم والالمنيوم من المصادر المهمة المستعملة لاستخلاص الفلز.




اوکسید الالمنیوم الطبیعی
(مع شوائب).



من خامات الالمنيوم
الطبیعیة .. (التربة).

هناك طرائق عديدة لاستخلاص الالمنيوم من مركباته. وتعتبر طريقة هول، في الوقت الحاضر، من احسنها




البوكسايت.

واكفيها. حيث تستعمل في الصناعة بشكل واسع. وتعتمد هذه الطريقة على التحليل الكهربائي للألومنيا Al_2O_3 النقية في حمام من مناصر الكريوليت $\text{NaF}_3(\text{NaF})_3$ (أو تكتب صيغته Na_3AlF_6) بدرجة حرارة (1000°C) وباستعمال أقطاب كاربونية. ولا توجد الألومنيا Al_2O_3 نقية في الطبيعة بل توجد ضمن الخام المعروف بالبوكسايت $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ مع شوائب من الحديد وغيرها.



مناصر الالمنيوم.

ينقى خام البوكسايت كيميائياً من الشوائب للحصول على أوكسيد الالمنيوم النقي Al_2O_3 (الألومنيا) والذي له درجة انصهار عالية ويذاب في مناصر الكريوليت الذي يعمل على تخفيض درجة انصهار الألومنيا. يوضع المناصر في خلية تحليل كهربائية كما في الشكل (3 - 2) وعند امرار التيار الكهربائي يتجمع الالمنيوم على شكل مناصر في أسفل الخلية ويسحب بين مدة و أخرى.



الشكل (3 - 2)
خلية هول لاستخلاص
الالمنيوم.

3 - 3 - 3 خواص الالمنيوم 1 - الخواص الفيزيائية

الالمنيوم فلز ذو مظهر فضي جيد التوصيل للحرارة والكهربائية وقليل الكثافة.

2 - الخواص الكيميائية

أ - تأثير الاوكسجين في الالمنيوم

ذكرنا سابقاً بأنه عند تعرض الالمنيوم الى الهواء يتآكسد سطحه الخارجي فقط، فيكتسي الالمنيوم بطبقة رقيقة جداً من اوكسиде الذي يكون شديد اللتصاق بسطح الفلز، وهذا ما يقي الفلز من استمرار التآكل، وهذا غير ما يحدث في عنصر الحديد.

ب - يحترق مسحوق الالمنيوم بشدة وبلهب ساطع محراً طاقة عالية ويحدث التفاعل حسب المعادلة الآتية:




ج - الالمنيوم عامل مختزل

يوضع خليط من مسحوق الالمنيوم واوكسيد الحديد (III)

تمرين (2 - 3) في وعاء فيه رمل، ثم يثبت شريط قارن بين عمليتي تآكسد الالمنيوم والحديد بتأثير مناسب وتحرق نهاية الشريط مع الجو .

حديد (III) تفاعلاً شديداً مصحوباً بانبعاث كمية كبيرة من الحرارة وبلهب ساطع مع تطاير شرر كما في الشكل المجاور. وينتج عن هذا التفاعل تكون منصهر الحديد، نتيجة قيام الالمنيوم باختزال اوكسيد الحديد (III) وتحرير الحديد الذي انصهر بفعل الحرارة العالية، ويسمى هذا التفاعل بتفاعل الترميت، والمعادلة التالية توضح ذلك.



ويفاد من هذا التفاعل في لحيم الاجهزة الحديدية الكبيرة وقضبان سكك الحديد. [لاحظ الشكل (3 - 3)]. كما يستعمل الالمنيوم لاستخلاص بعض الفلزات من خاماتها الموجودة على هيئة اكاسيد اعتماداً على كونه عالماً مختزاً.



تفاعل الترميت.

تمرين (3 - 3)
قارن بين عمليتي تآكسد الالمنيوم والحديد بتأثير الجو .




الشكل (3 - 3)

استخدام تفاعل الترميت في
لحيم قضبان سك الحديد.

د - تفاعل الالمنيوم مع الحوامض والقواعد:

يتفاعل الالمنيوم مع حامض الهيدروكلوريك المخفف بسهولة محرراً غاز الهيدروجين ومكوناً كلوريد الالمنيوم:



ولا يستمر تفاعل الالمنيوم مع كل من حامض النتريك المخفف والمركز ، بسبب تكون طبقة من اوكسيده Al_2O_3 التي تعزل الحامض عن الفلز، فيتوقف التفاعل، ويفاد من هذه الخاصية في حفظ حامض النتريك (التيزاب) ونقله بأوان من الالمنيوم.

يتفاعل الالمنيوم مع محليل القواعد مثل محلول هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم في الماء محرراً غاز الهيدروجين وملح الالمنيوم.

نستنتج من اعلاه بأن عنصر الالمنيوم يتفاعل مع الحوامض والقواعد محرراً غاز الهيدروجين في الحالتين ويدعى هذا السلوك بالسلوك الامفوتييري.

٣ - ٣ - ٤ : استعمالات الالمنيوم:

اخترنا هذا العنصر للتوضع في دراسته نظرياً وعملياً ضمن حدود هذه المرحلة وذلك لأن هذا العنصر هو عنصر المستقبل بعد ان ينضب عنصر الحديد. والبحوث العلمية مستمرة لتسهيل امكانية استخلاص الالمنيوم من الطين. يمتاز عنصر الالمنيوم وسبائكه بأن نسبة الكتلة فيه تكون عالية جداً وعند تعرضه للهواء الجوي تتكون عليه طبقة رقيقة من اوكسيد الالمنيوم صلدة جداً تلتصلق بشدة على السطح مانعة الهواء من الوصول الى الفلز فيتوقف التأكسد وبذلك يكون الالمنيوم فلز يقي نفسه شر التآكل، وهذا ما لا يحدث في حالة الحديد لماذا ؟ لأن طبقة اوكسيد الحديد المكونة (الصدأ) هشة تفتت بسهولة فتفسح المجال للهواء (الاوكسجين والرطوبة) باستمرار فعلها بالتآكل.



يمكن استعمال الالمنيوم في صناعة الاسلاك الكهربائية، حيث ان توصيل الالمنيوم للكهربائية يساوي ضعف توصيل النحاس، اذا اخذنا نفس الكتلة من العنصرين، وهذا يؤدي الى ان نصف قطر الاسلاك المصنوعة من الالمنيوم يكون اكبر مما لاسلاك النحاس. لكن لكون الالمنيوم اكثر تمدداً او تقلصاً (بنسبة 39%) من النحاس لنفس المدى الحراري، فلا تصنع الاسلاك الكهربائية من الالمنيوم الا ضمن نطاق محدود.

تصنع حالياً من الالمنيوم صفائح رقيقة لتغليف الاطعمة والادوية والسكائر وللاستعمالات المنزلية الاخرى. وكذلك تصنع منه القناني المعدنية المتنوعة الاحجام. كما تصنع من سبائكه الخفيفة؛ الاواني والقدور والملاعق والصفائح والكراسي وكثير من الصناعات الاخرى في بلدنا العراق. بحيث لا يخلو بيت من سبيكته المعروفة بالـ(فافون). ان صناعات الالمنيوم



استعمال الالمنيوم في
صناعات متنوعة.



سبائك مصنوعة من
الألمنيوم.



سبائك الالمنيوم.

المحلية أخذة بالازدهار يوماً بعد يوم. كما ويستعمل الالمنيوم في عمل مرايا التلسكوبات الكبيرة، والعديد من الصناعات الأخرى. الا ان كميات كبيرة منه تصنع منها سبائك تستعمل في صناعة هيابكل الطائرات والقطارات الخفيفة. وفي هيابكل الابنية الخففة وبعض اجزاء السيارات، كذلك تصنع من سبائك القناني الخاصة لحفظ السوائل بدرجة حرارية منخفضة جداً، مثل سوائل الاوكسجين والاركون والنتروجين وغيرها.. والسبب في ذلك هو ان قوة الالمنيوم تزداد كلما انخفضت درجة الحرارة عن الصفر السيليزي. اما العناصر التي تخلط مع الالمنيوم في صنع السبائك فهي الرصاص والنحاس والزنك والمغنيسيوم.

3 - 3 - 5 سبائك الالمنيوم

اهم سبائك الالمنيوم:

1 - سبيكة الديورالومين

تتكون هذه السبيكة من نسبة عالية من الالمنيوم ونسبة قليلة من كل من النحاس والمغنيسيوم وقد تحتوي على المغنيز ايضاً وتمتاز بخفتها وصلابتها. وتستعمل في بناء بعض اجزاء الطائرات.

2 - برونز الالمنيوم

تتكون هذه السبيكة من نسبة قليلة من الالمنيوم ونسبة عالية من النحاس واحياناً فلزات أخرى. ومن خواص هذه السبيكة الجيدة، انها تقاوم التآكل، ويتغير لون السبيكة بتغير نسب مكوناتها حيث يتدرج من لون النحاس الى لون الذهب والى لون الفضة ... لذلك يقاد من هذه الخاصية بصناعة أدوات الزينة.


3 - 3 - 6 مركبات الالمنيوم

اهم مركبات الالمنيوم:

1 - هيدروكسيد الالمنيوم Al(OH)

يحضر من تفاعل محلول المائي لأحد املاح الالمنيوم،


مثل محلول كبريتات الالمنيوم $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ مع هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم كما في المعادلة الآتية:



وهيdroكسيد الالمنيوم مادة جيلاتينية بيضاء لا تذوب في الماء.

2 - اوكسيد الالمنيوم Al_2O_3

يحضر من التسخين الشديد لهيدروكسيد الالمنيوم كما في المعادلة الآتية:



وقد يوجد اوكسيد الالمنيوم في الطبيعة بصورة غير نقاء، وعلى شكل مادة صلدة تستعمل في صقل المعادن وتلميعها. كما يدخل اوكسيد الالمنيوم في تركيب الكثير من الاحجار الكريمة عندما يكون مخلوطاً مع بعض المعادن التي تعطيها مظهراً براقاً والواناً جميلة.



اوکسید الالمنیوم فی
الاحجار الكريمة.


3 - الشب Alum

عند مزج مقدارين متكافئين من محلولي كبريتات الالمنيوم وكبريتات البوتاسيوم المائيين وترك محلول ليتبخر ماؤه، نحصل على بلورات ملح يحتوي على كبريتات الالمنيوم وكبريتات البوتاسيوم وجزيئات ماء التبلور بنسبة كتليلية ثابتة. و الصيغة العامة للشب هي: $[\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]$ ويسمى ايضاً شب البوتاس.

يستخدم الشب الاعتيادي في مجالات متعددة منها لتعقيم بعض الجروح الخفيفة، حيث يساعد على تخثر الدم بسهولة، بسبب ذوبانه في الماء وترسب $\text{Al}(\text{OH})_3$ على الجروح حيث يوقف سيلان الدم فيتختثر كما يستخدم في تثبيت الأصابع على الأقمشة وفي تصفية مياه الشرب.

٣ - ٣ - ٧ الكشف عن ايون الالمنيوم في محليل مركباته

يكشف عن ايون الالمنيوم في مركباته بوساطة محلول قاعدي مثل هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم حيث تتفاعل هذه المواد مع ايون الالمنيوم Al^{3+} لتكون راسباً ابيض جلاتينياً هو هيدروكسيد الالمنيوم $\text{Al}(\text{OH})_3$ كما في المعادلة الآتية:



فمثلاً:



ان هذا الراسب ونعني به $\text{Al}(\text{OH})_3$ يذوب عندما تضاف اليه زيادة من هيدروكسيد الصوديوم NaOH بسبب تكون الومينات الصوديوم الذائبة ويذوب كذلك باضافة حامض اليه بسبب السلوك الامفوتييري .

أسئلة الفصل الثالث

5.3 اختر من القائمة (ب) ما يناسب كل عبارة في القائمة (أ) :

القائمة (أ) :

- 1 - عنصر ذو سلوك امفوتيري
- 2 - تفاعل يسلك فيه الالمنيوم عاملًا مختلاً ويحرر طاقة حرارية عالية تذيب الحديد.
- 3 - اوكسيد الالمنيوم
- 4 - ملح مزدوج من كبريتات البوتاسيوم والالمنيوم
- 5 - احد عناصر الزمرة IIIA هو شبه فلز.

القائمة (ب)

- 1 - الترميت
- 2 - الشب
- 3 - الالومينا
- 4 - الالمنيوم
- 5 - الانديوم.
- 6 - البورون.

1.3 حدد العنصر الذي لا ينتمي للزمرة الثالثة مما يأتي مع ذكر السبب:



2.3 اختر من بين القوسيين ما يكمل المعنى العلمي في العبارات الآتية:

1 - الكاليلوم Ga عنصر ينتمي للزمرة: (الاولى ، الثانية ، الثالثة).

2 - يكون عنصر الالمنيوم في عملية الترميت عاملًا (مساعداً ، مؤكسداً ، مختلاً).

3 - سبيكة برونز الالمنيوم تتكون من نسبة (عالية ، قليلة ، 100%) من عنصر الالمنيوم.

3.3 اكمل العبارات الآتية بما تراه مناسباً لاتمام المعنى:

1 - يتفاعل الالمنيوم مع الحواضن محرراً غاز وعند تفاعله مع القواعد يحرر لانه

2 - تأثير اوكسجين الهواء الجوي في الالمنيوم لا يؤدي الى تأكله كما في حالة الحديد وذلك بسبب

3- التسخين الشديد لهيدرووكسيد الالمنيوم يعطي

4 - ملح مكون من عنصري البوتاسيوم والالمنيوم يدعى

5 - عنصر الالمنيوم يتفاعل مع الحواضن والقواعد ويدعى هذا السلوك ب

4.3 كيف يستخلص الالمنيوم مع رسم الجهاز والتأشير الكامل على الاجزاء؟

الفصل الرابع

4

المحاليل والتعبير عن التركيز

Solutions and Expression for Concentration



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على أن:

- يتعرف على المحاليل وطبيعتها.
- يميز بين أنواع المحاليل.
- يفهم قابلية الذوبان والعوامل المؤثرة فيها.
- يتعرف على بعض التعبيرات عن التراكيز وهي النسبة الكتليلية والنسبة الدجمية .

4 - 1 مقدمة

تعتبر المحاليل مهمة في علم الكيمياء إلى أبعد حد، إذ أن المحاليل السائلة بصفة خاصة تكون هي الوسط المألف غالباً بالنسبة للتفاعلات الكيميائية حيث أنها تساعد على حدوث التداخل بين المواد المتفاعلة لحدوث التفاعل الكيميائي.


هل تعلم

الماء الذي نستخدمه في حياتنا اليومية يعتبر محلول حيث يحتوي على الاملاح الفلزية والبكتيريا وكثير من المواد الأخرى الذي يحدد نسبة تراكيزها المسماوح بتواجدها في مياه الشرب طبقاً للمعايير العالمية.

Solution

4 - 2 محلول

خلط متجانس مكون من مادتين أو أكثر لا يحدث بينها تفاعل كيميائي، تسمى المادة الموجودة بوفرة في محلول مذيب (Solvent) وتسمى المادة الموجودة بقلة في محلول بالمذاب (Solute). ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة الآتية:



محلول حامضي



محلول قاعدي



محلول ملحي

الشكل (4 - 1)
أنواع مختلفة من المحاليل



غاز كلوريد
الهييدروجين

محلول حامض
الهييدروكلوريك

وهنالك انواع أخرى للمحاليل منها غاز في غاز مثل الهواء الجوي، و محلول صلب في صلب مثل السبائك المختلفة و اهمها قطع النقود المعدنية و سبائك الذهب و سنتطرق في هذا الفصل الى المحاليل السائلة فقط.



تختلف المحاليل في تسميتها وذلك حسب كمية المذاب والمذيب او طبيعة عملية الذوبان. فال محلول الذي يوصف بأنه مشبع (Saturated Solution) هو المحلول الذي يحتوي على أكبر قدر ممكناً من المذاب وان المذيب لا يستطيع ان يذيب اي زيادة اخرى من المذاب عند درجة حرارة محددة وضغط معين. أما عندما تفوق كمية المذاب في محلول ما قد يمكن للمذيب من اذابته في الظروف الاعتيادية يسمى هذا المحلول بفوق المشبع (Supersaturated Solution) وهذا النوع من المحاليل غير ثابت حيث أنها تلفظ الكمية الزائدة من المذاب على شكل راسب ليتحول إلى محلول مشبع. ويعرف المحلول بأنه غير مشبع (Unsaturated Solution) اذا احتوى على كمية من المذاب اقل من الكمية اللازمة للتسبّع عند درجة الحرارة والضغط المحددين الشكل (4 - 2).

عندما تتآكل جزيئات المذاب في المحلول يسمى عند ذلك المحلول بالمحلول الالكتروليتي (Electrolyte Solution)، والمذاب قد يكون الكتروليتاً قوياً عندما تتآكل جزيئاته بشكل تام في المحلول مثل حامض الهيدروكلوريك [الشكل 4 - 3]. وقد يكون المذاب الكتروليتاً ضعيفاً اي ان

- الشكل (4 - 2)
أ - محلول مشبع.
ب - محلول فوق المشبع.
ج - محلول غير مشبع.

الشكل (4 - 3)
تتأكل جزيئات الالكتروليت القوي بشكل تام في المذيب.



جزيئاته تتآين بدرجةٍ غير تامة وأحياناً بدرجة بسيطة جداً مثل حامض الهيدروفلوريك حيث يتفكك (يتآين) بدرجة قليلة جداً في المذيب وتكون ايوناته في حالة توازن مع الجزيئات غير المتأينة [الشكل (4 - 4)], وفي المعادلة أدناه تعني الاسهم المتعاكسة ان المادة المتأينة جزئياً في حالة توازن مع الايونات الناتجة.



وهناك مركبات جزيئاتها لا تتآين في المذيب مطلقاً تسمى محليلها بمحاليل غير الكتروليتية مثل السكر والكحول الاشيلي.


Solubility

4 - 3 قابلية الذوبان

تعرف بأنها اكبر كمية من المادة المذابة يمكن ان تذوب في حجم ثابت من مذيب معين للحصول على محلول مشبع عند درجة حرارة معلومة (محددة). وتخالف قابلية الذوبان تبعاً لطبيعة المذاب والمذيب ودرجة الحرارة والضغط. والتي سنشرحها بايجاز كما يأتي.

4 - 3 - 1 طبيعة المذاب والمذيب

اذا وضعت كمية صغيرة من بلورات ملح الطعام في دورق به ماء، فان البلورات تذوب فيه ببطء، واذا رج الدورق بمحتوياته تذوب البلورات بسرعة اكبر، حيث تؤدي عملية الرج الى ملامسة سطح البلورات بالماء بصورة اكبر، لان عملية الذوبان ظاهرة تتعلق بالسطح المعرض للذوبان، وهذا السبب في تحريك قدح الشاي بالملعقة بعد وضع السكر فيه (الشكل 4 - 5). كما ان مسحوق السكر يذوب اسرع من حبيبات السكر، لان سطح المسحوق المعرض للاماسة جزيئات الماء يكون اكبر من السطح لحبيبات السكر، اذاً نستنتج انه كلما ازداد سطح المادة المذابة المعرض للمذيب ازدادت سرعة الذوبان، اما بالنسبة للمذيب فالطبيعة القطبية او غير



الشكل (4 - 4)

تتأين جزيئات الالكتروليت الضعيف في المذيب بشكل جزئي وتكون الايونات الناتجة متواجدة بتوازن مع الجزيئات غير المتأينة.



الشكل (5 - 4)

يذوب السكر بسرعة عند تحريكه بالملعقة.



القطبية هي التي تحدد قابلية على الاذابة وحسب قاعدة تنص على ان المذيب يذيب شبيهه، اي ان المذيب القطبي يذوب المذاب القطبي والعكس صحيح. من الضروري معرفة ان المادة غير القابلة للذوبان في مذيب ما، لا تذوب مهما كانت قوة التحريك او طول مده.

٤ - ٣ - ٢ تأثير درجة الحرارة

اذا اخذنا قدحين متماثلين يحتوي كل منهما على كمية متساوية من سائل احدهما ساخن والآخر بارد واذبنا ملعقة من السكر في كل منهما نلاحظ ان السكر المذاب في قدح السائل الساخن يذوب بصورة اسرع منه في السكر المذاب في السائل البارد والسبب في هذا لان طاقة حركة جزيئات السائل تزداد عند درجات الحرارة المرتفعة مما يزيد احتمالات قوة تصادم جزيئات السائل بسطح بلورات السكر فيساعد على سرعة ذوبانه، لاحظ الشكل (٤ - ٦).

الشكل (٤ - ٦)

- أ - يذوب السكر ببطء في قدح مثلج من الشاي.
- ب - يذوب السكر بسرعة في قدح ساخن من الشاي.



الشكل (٧ - ٤)

عند فتح غطاء قنية المشروب الغازي يقل الضغط لذلك يتتصاعد غاز ثانئي اوکسید الكاربون.

٤ - ٣ - ٣ تأثير الضغط

يمكن ان نلاحظ تأثير الضغط بوضوح في قابلية ذوبان المواد الغازية التي تزداد ذوبانيتها كلما ازداد الضغط الجزيئي للغاز فوق سطح محلول. فمثلاً في المشروبات الغازية يكون تركيز ثنائي اوکسید الكاربون CO_2 المذاب في محلول معتمداً على ضغط CO_2 المسلط على سطح المشروب الغازي وعند فتح غطاء الزجاجة فان ضغط CO_2 يقل لذا تقل قابلية ذوبانه وتتكون فقاعات CO_2 التي تتتصاعد في المشروب الغازي، لاحظ الشكل (٧ - ٤).

Concentration of Solution ٤ - ٤ تركيز المحلول

كما أسلفنا ان المحلول يتكون من جزئين رئيسيين هما المذاب والمذيب. وتخالف المحاليل من حيث كميات المذاب والمذيب فيها. وهناك طرق يمكن بواسطتها التعبير عن هذه الكميات وعلاقتها بعضها ببعض ويعبر عن هذه العلاقة عادة بتركيز المحلول. يعرف تركيز المحلول بأنه كمية المادة المذابة في كمية معينة من المذيب أو المحلول، ويمكن التعبير عن تركيز المحلول وصفياً أو كميّاً ويستخدم مصطلحي مخفف (Dilute) ومركز (Concentrated) لوصف تركيز المحلول [الشكل (٤ - ٨)]. فال محلول الذي يحتوي على كمية قليلة نسبياً من المذاب يوصف بأنه محلول مخفف. بينما يوصف المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب بأنه محلول مركز [الشكل (٤ - ٩)]، كما يمكن تحويل المحلول إلى مركز إلى مخفف بإضافة كمية أكبر من المذيب إليه.

اما كميّاً فيمكن ان نعبر عن تركيز المحلول بعدة طرائق اهمها:



الشكل (٤ - ٨)
 محلول مخفف ومحلول مركز
 من كبريتات النحاس.



(أ)



(ب)

٤ - ٤ - ١ التركيز بالنسبة المئوية الكتليلية

وهو عدد وحدات الكتلة من المادة المذابة في 100 وحدة كتلة من المحلول (النسبة الكتليلية للمذاب او المذيب) او ببساطة هي عدد غرامات المذاب في مئة غرام من المحلول وتحسب النسبة المئوية الكتليلية للمذاب والمذيب كما يأتي:

$$\text{النسبة الكتليلية للمذاب} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\%$$

او ان :

$$\text{النسبة الكتليلية للمذاب} = \frac{\text{كتلة المذاب } (m_1)}{\text{كتلة المحلول } (m_1 + m_2)} \times 100\%$$

او بتعبير آخر:

$$\text{النسبة الكتليلية للمذاب} = \frac{\text{كتلة المذاب } (m_1)}{\text{كتلة المحلول } (m_T)} \times 100\%$$

الشكل (٤ - ٩)
 أ - توزيع جزيئات المذاب
 في المحلول المركز .
 ب - توزيع جزيئات المذاب
 في المحلول المخفف .

حيث (m_1) كتلة المذاب و (m_2) كتلة المذيب و (m_T) كتلة محلول {مجموع كتلة المذاب والمذيب} (m_1+m_2) . وبالطريقة نفسها يمكن ان نكتب النسبة المئوية الكتالية للمذيب بالعلاقة الرياضية الآتية:

$$\text{النسبة الكتالية للمذيب} = \frac{\text{كتلة المذيب}}{\text{كتلة محلول}} \times \%100$$

وبشكل عام يمكن ان نكتب الصيغة الرياضية للتعبير عن التركيز الكتلي المئوي:

$$\text{النسبة الكتالية لأي مكون} = \frac{\text{كتلة المكون}}{\text{كتلة محلول}} \times \%100$$

مثال 4 - 1:

ما النسبة الكتالية للمذاب والمذيب لمحلول مكون من g 15.3 ملح الطعام مذاب في g 155 من الماء؟

الحل:

$$\text{كتلة المذاب: } m_1 = 15.3 \text{ g}$$

$$\text{كتلة المذيب: } m_2 = 155 \text{ g}$$

$$\text{كتلة محلول: } m_T = m_1 + m_2$$

$$= 15.3 + 155$$

$$= 170.3 \text{ g}$$

$$\text{النسبة الكتالية للمذاب} = \%100 \times \frac{m_1}{m_T}$$

$$\% 8.98 = \%100 \times \frac{15.3 \text{ g}}{170.3 \text{ g}} =$$

$$\text{النسبة الكتالية للمذيب} = \%100 \times \frac{m_2}{m_T}$$

$$\% 91.02 = \%100 \times \frac{155 \text{ g}}{170.3 \text{ g}} =$$

مثال 4 - 2:

نموذج من الخل يحتوي على نسبة كتليلية مقدارها 4 % من حامض الخليك. ما كمية الخل التي نحتاجها لكي نحصل على 20 g من حامض الخليك؟

الحل:

$$\text{النسبة الكتليلية للمذاب} = \frac{m_1}{m_T} \times 100\%$$

$$\frac{20 \text{ g}}{m_T} = 4\%$$

$$\frac{2000}{4} = m_T$$

$$\text{كمية الخل التي نحتاجها} = m_T = 500 \text{ g}$$

هل تعلم

ان محلول الخل يتكون من حامض الخليك بتركيز مختلف مذاب في كمية من الماء.

تمرين (2 - 4)

احسب النسب الكتليلية لكل من حامض الهيدروكلوريك والماء عند تخفيف 20 g من HCl في 80 g من الماء المقطر.

4 - 4 - 2 التركيز بالنسبة المئوية الحجمية

وهي نسبة حجم كل مكون من مكونات محلول الى الحجم الكلي للمحلول مضروباً في مئة.

$$\text{النسبة الحجمية للمذاب} = \frac{\text{حجم المذاب } (V_1)}{\text{حجم محلول } (V_1 + V_2)} \times 100\%$$

$$\text{النسبة الحجمية للمذاب} = \frac{\text{حجم المذاب } (V_1)}{\text{حجم محلول } (V_T)} \times 100\%$$

وبنفس الطريقة يمكن ايجاد النسبة المئوية الحجمية للمذيب:

$$\text{النسبة الحجمية للمذيب} = \frac{\text{حجم المذيب } (V_2)}{\text{حجم محلول } (V_T)} \times 100\%$$

يرمز لحجم المذاب V_1 ولحجم المذيب V_2 ولحجم محلول V_T [ويمثل مجموع حجمي المذاب والمذيب $(V_1 + V_2)$] وبشكل عام يمكن ان نكتب الصيغة الرياضية للتعبير عن

التركيز المئوي الحجمي:

$$\text{النسبة الحجمية لأي مكون} = \frac{\text{حجم المكون}}{\text{حجم محلول من مكونات محلول}} \times \%100$$

لا بد هنا أن نذكر أن وحدات الحجم المستخدمة عادة هي اللتر (L) أو الملييلتر (mL) أو السنتيمتر المكعب (cm³), ومعاملات التحويل فيما بينها كالتالي:

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$$

مثال 4 :

احسب النسبة الحجمية لكل من حامض الخليك والماء في محلول تكون عند خلط 20 mL من حامض الخليك و 30 mL من الماء.

الحل:

$$V_1 = 20 \text{ mL} \quad \text{حجم المذاب:}$$

$$V_2 = 30 \text{ mL} \quad \text{حجم المذيب:}$$

$$\begin{aligned} V_T &= V_1 + V_2 && \text{حجم محلول:} \\ &= 20 + 30 \\ &= 50 \text{ mL} \end{aligned}$$

$$\text{النسبة الحجمية للمذاب} = \%100 \times \frac{V_1}{V_T}$$

$$\% 40 = \%100 \times \frac{20 \cancel{\text{mL}}}{50 \cancel{\text{mL}}} =$$

$$\text{النسبة الحجمية للمذيب} = \%100 \times \frac{V_2}{V_T}$$

$$\% 60 = \%100 \times \frac{30 \cancel{\text{mL}}}{50 \cancel{\text{mL}}} =$$

مثال ٤ - ٤

ما حجم محلول كحول الايثيل بالمليلتر (mL) اللازم اضافته للماء ليصبح حجم المحلول الكلي 50 mL لتكون نسبته الحجمية 40%.

الحل :

$$\text{النسبة الحجمية للمذاب} = \frac{V_1}{V_t} \times 100\%$$

$$\frac{V_1}{50 \text{ mL}} = 40\%$$

وعليه ان حجم كحول الايثيل بالمليلتر :

$$V_1 = 20 \text{ mL}$$

٤ - ٣ التركيز بالكتلة / الحجم

يعبر في بعض الاحيان عن التركيز بوحدة كتلة المذاب (بالغرامات) في حجم معين من المحلول (باللتر) وتكون وحدة هذا النوع من التراكيز هي (غرام/لتر) (g / L)

$$\text{التركيز (غرام/لتر)} = \frac{\text{كتلة المذاب (م)} (\text{بالغرام})}{\text{حجم المحلول (V)} (\text{بالتلتر})}$$

ومن الجدير بالذكر هنا ان هذا التعبير عن التركيز هو نفسه تعريف الكثافة (Density) والتي هي وحدة كتلة الحجم. فاذا رمزنا للكثافة بالحرف اللاتيني رو (ρ) وللكتلة (m) وللحجم (V) وعليه فالكثافة تعرف بالعلاقة الآتية:

$$\text{الكثافة (غم/لتر)} = \frac{\text{الكتلة (غرام)}}{\text{الحجم (لترا)}}$$

$$\rho (\text{g/L}) = \frac{m (\text{g})}{V (\text{L})}$$

ويمكن استخدام اي وحدة اخرى للحجم مثل (mL) او (cm³).

تمرين (٤ - ٤)

احسب النسبة المئوية بالحجم لكل من (H_2SO_4) والماء عند اضافة 20 mL من (H_2SO_4) في 80 mL من الماء المقطر.



١ - كتلة من كبريتات النحاس.

ب - محلول من كبريتات النحاس.

تمرين (٤ - ٥)

ما كتلة هيدروكسيد الصوديوم اللازم اضافتها في لتر من الماء المقطر للحصول على تركيز منها في المحلول يمقدار 0.5 g/L.

مثال 4 :

اذيب 5 g من كبريتات النحاس في 0.5 L من الماء المقطر احسب تركيز المذاب في محلول بوحدة g/L.

الحل:

$$\text{التركيز (غرام/لتر)} = \frac{m \text{ (g)}}{V \text{ (L)}} = \frac{5 \text{ g}}{0.5 \text{ L}} = 10 \text{ g/L}$$

مثال 4 :

احسب النسبة الكتليلية لکحول المثيل لمحلول يحتوي على 27.5 g من کحول المثيل و 175 mL من الماء. (افترض ان كثافة الماء تساوي 1.00 g/mL).

الحل:

يمكن حساب كتلة الماء التي تحتاجها لايجاد النسبة الكتليلية باستخدام تعريف الكثافة.

$$\rho \text{ (g / mL)} = \frac{m \text{ (g)}}{V \text{ (mL)}}$$

ومنه:

$$m \text{ (g)} = \rho \text{ (g / mL)} \times V \text{ (mL)}$$

$$m \text{ (g)} = 1.00 \text{ (g / mL)} \times 175 \text{ (mL)}$$

$$m \text{ (g)} = 175 \text{ g}$$

$$m_1 = 27.5 \text{ g} \quad \text{كتلة کحول المثيل:}$$

$$m_2 = 175 \text{ g} \quad \text{كتلة الماء:}$$

$$m_T = m_1 + m_2 \quad \text{كتلة محلول:}$$

$$= 27.5 + 175$$

$$= 202.5 \text{ g}$$

$$\text{النسبة الكتليلية لکحول المثيل} = \% 100 \times \frac{m_1}{m_T}$$

$$\% 13.6 = \% 100 \times \frac{27.5 \text{ g}}{202.5 \text{ g}} =$$

أسئلة الفصل الرابع

ج - طاقة حركة جزيئات السكر تزداد عند درجة الحرارة المرتفعة.

4 - يمكن تحول المحلول المركز إلى مخفف وذلك:

- أ - بزيادة تركيز المذاب.
- ب - بتخزين المحلول.

ج - بإضافة مذيب أكثر إلى المحلول.

3.4 ما الفرق بين :

أ - محلول مخفف ومحلول مركز.

ب - مذاب الكتروليتي ضعيف ومذاب الكتروليتي قوي.

ج - محلول فوق المشبع ومحلول غير مشبع.

4.4 ما هي العوامل المؤثرة على قابلية الذوبان.

5.4 اذيب 5 g من كبريتات النحاس في 20 g من الماء المقطر، احسب النسبة المئوية الكتليلية للمذاب وكذلك للمذيب.

6.4 ما حجم الماء باللتر اللازم اضافته إلى 10 g من هيدروكسيد البوتاسيوم للحصول على محلول تركيزه 2.5 g/L .

7.4 ما النسبة المئوية الحجمية لحامض الهيدروكلوريك وكذلك للماء عند اضافة 25 mL من الحامض إلى 75 mL من الماء.

8.4 احسب النسبة المئوية الكتليلية لـ NaCl في محلول يحتوي على 15.3 g من NaCl و 155.09 g من الماء.

1.4 بين بايجاز ما المقصود بكل مما يأتي:

1 - المحلول.

2 - المحلول المشبع.

3 - قابلية الذوبان.

4 - المحلول الالكتروليتي.

5 - المحلول المركز.

6 - التركيز بالنسبة المئوية الكتليلية.

7 - التركيز بالنسبة المئوية الحجمية.

2.4 اختر ما يناسب التعبير الآتية:

1 - محلول صلب في صلب مثل:

أ - علبة عصير.

ب - قطعة نقدية.

ج - محلول ملحي.

2 - المذاب الالكتروليتي الضعيف هو:

أ - المذاب الذي يتainen بدرجة كاملة في المذيب.

ب - المذاب الذي يتainen بدرجة غير كاملة في المذيب.

ج - المذاب الذي يذوب بسرعة في المذيب.

3 - السكر المذاب في قدر الماء الساخن يذوب بصورة أسرع عنه في الماء البارد بسبب:

أ - طاقة حركة جزيئات الماء تقل عند درجة الحرارة المرتفعة.

ب - طاقة حركة جزيئات الماء تزداد عند درجة الحرارة المرتفعة.

أسئلة الفصل الرابع

يمكن الحصول عليها من 274 g من ماء المحيط.

16.4 جد حجم الكحول بالمليلتر (mL) الموجود في المحاليل الآتية:

ا) 480 mL من محلول يحتوي على 3.7% نسبة مئوية حجمية من الكحول.

ب) 103 mL من محلول يحتوي على 10.2% نسبة مئوية حجمية من الكحول.

ج) 0.3 L من محلول يحتوي على 14.3% نسبة مئوية حجمية من الكحول.

17.4 جد كمية كلوريد البوتاسيوم KCl بالغرام (g) الموجود في المحاليل الآتية:

ا) 19.7 g من محلول يحتوي على 1.08% نسبة مئوية كتليلية من KCl.

ب) 23.2 kg من محلول يحتوي على 18.7% نسبة مئوية كتليلية من KCl.

ج) 38 mg من محلول يحتوي على 12% نسبة مئوية كتليلية من KCl.

18.4 اكمل الفراغات في الجدول الآتي:

النسبة المئوية الكتليلية للمذاب	كتلة المحلول	كتلة المذيب	كتلة المذاب
.....	238.1 g	15.5 g
% 12.0	22.8 g
.....	212.1 g	183.3 g
% 15.3	31.52 g

9.4 احسب التركيز بوحدة غم/لتر لمحلول يحتوي على 27.5 g من كحول الميثيل مذاب في 175 mL من الماء.

10.4 افترض عينة من الماء مأخوذة من قاع بحيرة الحبانية تحتوي على 8.5% بالكتلة من ثنائي اوكسيد الكاربون . ما هي كمية

ثنائي اوكسيد الكاربون بالغرام الموجودة في 28.6 L من محلول الماء (معلومة: كثافة محلول تساوي 1.03 g/mL).

11.4 عصير يحتوي على نسبة مئوية كتليلية مقدارها 11.5% من السكر. ما هو حجم العصير بالمليلتر المحتوي على 85.2 g من السكر (افتراض كثافة محلول تساوي 1.00 g/mL).

12.4 احسب التركيز بالنسبة المئوية الكتليلية لمكونات محلول يحتوي على 19 g من مذاب في 158 g من مذيب.

13.4 احسب تركيز مكونات المحاليل التالية بالنسبة المئوية الكتليلية للمذيب .

أ - 10.2 g من NaCl في 155 g من H₂O.
ب - 48.2 g من السكر ور梓 في 498 g من H₂O.
ج - 0.245 g من حامض الخليك في 4.91 g من H₂O.

14.4 مشروب غازي يحتوي على 45 g من السكر في 309 g من الماء. ما هي النسبة المئوية الكتليلية للسكر في المشروب الغازي.

15.4 يحتوي ماء المحيط على نسبة مئوية كتليلية 3.5% من NaCl . ما كمية الملح التي

أسئلة الفصل الرابع

2503.93 g 10.4

740.87 mL 11.4

12.4 النسبة المئوية الكتالية للمذاب = %10.73

النسبة المئوية المذيب للمذاب = %89.27

%91.18 ب: 13.4 ٪ 93.83 أ:

ج: 95.25

14.4 النسبة المئوية الكتالية للسكر = %12.71

9.59 g 15.4

10.51 mL ب: 17.76 mL أ: 16.4

ج: 42.9 mL

4338.4 g ب: 0.21 g أ: 17.4

ج: $g \times 10^{-3}$ 4.56

18.4

النسبة المئوية الكتالية للمذاب او المذيب	كتلة المحلول	كتلة المذيب	كتلة المذاب
% 6.11	253.6 g	238.1 g	15.5 g
% 12.0	190.0 g	167.2 g	22.8 g
% 13.57	212.1 g	183.3 g	28.8 g
% 15.3	206.0 g	174.48 g	31.52 g

19.4

النسبة المئوية الحجمية للمذاب	حجم المحلول	حجم المذيب	حجم المذاب
% 9.25	27.55 cm³	25.0 mL	2.55 mL
% 3.8	120.52 cm³	115.9 mL	4.58 mL
% 5.07	27.2 cm³	25.82 mL	1.38 mL
% 5.8	408.6 cm³	384.9 mL	23.7 cm³

اكمـل الفراغات في الجدول الآتي: 19.4

النسبة المئوية الحجمية للمذاب	حجم المحلول	حجم المذيب	حجم المذاب
.....	25.0 mL	2.55 mL
% 3.8	4.58 mL
.....	27.2 cm³	1.38 mL
% 5.8	23.7 cm³

اجوبة نموذجية لأسئلة وتمارين الفصل

التمارين:

1.4 النسبة المئوية الكتالية للمذاب %8.82 ، النسبة

الكتالية للمذيب = %91.18 .

2.4 النسبة المئوية للحامض = %20 ، النسبة

الكتالية للماء = %80 .

3.4 النسبة الحجمية لـ H_2SO_4 = %20

النسبة الحجمية لـ H_2O = %80

4.4 كتلة هيدروكسيد الصوديوم = 0.5 g

5.4 كتلة KCl = 20.52 g

اجوبة اسئلة الفصل:

5.4 النسبة المئوية الكتالية لكبريتات

النحاس $CuSO_4$ = %20

النسبة المئوية الكتالية للماء H_2O = %80

$V(L) = 4L$ 6.4

7.4 النسبة الحجمية للحامض = %25

النسبة الحجمية للماء = %75

8.4 النسبة الكتالية لـ $NaCl$ = %8.98

9.4 التركيز L g/L = 157.14

الزمرة الرابعة

Group IVA



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على أن :

- يعرف موقع الزمرة في الجدول الدوري وأسماء ورموز عناصرها.
- يتعرف على بعض الصفات العامة لعناصر الزمرة.
- يرسم الترتيب الإلكتروني لذرة السليكون.
- يعرف وجود السليكون في الطبيعة و أهميته.
- يفهم كيفية تحضير السليكون مختبرياً و صناعياً.
- يتعرف على خواصه الفيزيائية والكيميائية.
- يتعرف على مركبات السليكون الطبيعية والصناعية.
- يطلع على استخدامات السليكون.

5 - 1 عناصر الزمرة الرابعة IVA

تشمل الزمرة الرابعة عناصر الكاربون (C) والسلیکون (Si) والجرمانیوم (Ge) والقصدير (Sn) والرصاص (Pb). والشكل (5 - 1) يبيّن موقعها في الجدول الدوري.



1 IA	Periodic Table of Elements																		18 VIIA																
1 H	2 II A																			3 He															
3 Li	4 Be	3 IIIA		4 IVB		5 VB		6 VIB		7 VII B		8 VIIIB		9 VIB		10 IB		11 IB		12 IIB		13 IIIA		14 IVA		15 VA		16 VIA		17 VIIA		18 VIIA			
11 Na	12 Mg	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr										
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	55 Cs	56 Ba	57 La	58 Hf	59 Ta	60 W	61 Re	62 Os	63 Ir	64 Pt	65 Au	66 Hg	67 Tl	68 Pb	69 Bi	70 Po	71 At	72 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	90 Rf	91 Db	92 Sg	93 Bh	94 Hs	95 Mt	96 Uun	97 Uuu	98 Uub																								

5 - 2 الصفات العامة للزمرة الرابعة IVA

تنصف هذه الزمرة بأنها أكثر الزمر اختلافاً وتعدداً في صفات عناصرها، فعنصرها تظاهر انتقالاً واضحًا من الصفات اللافلزية إلى الصفات الفلزية كلما انتقلنا من أعلى الزمرة نحو أسفلها، أي بزيادة العدد الذري لها. فلكاربون خواص لا فلزية ويكون كل من السلیکون والجرمانیوم أشباه فلزات، بينما يعتبر القصدير والرصاص فلزات حقيقة. لذلك نرى أن لكل من عنصري القصدير والرصاص الصفات الفيزيائية للفلزات، كالكتافة العالية والتوصيل الحراري والكهربائي الجيدان وقابلية الطرق والسحب والمعان العاليان. وتنقل كذلك درجة الغليان والانصهار لعناصر الزمرة بالانتقال من أعلى إلى أسفل المجموعة.

تنصف عناصر هذه الزمرة كذلك بامتلاكها أربع الكترونات بخلافها الخارجي، حيث أنها تحتاج إلى أن تكتسب أو تفقد أو تساهم بأربعة الكترونات للوصول إلى ترتيب الكتروني

الشكل (5 - 1)
موقع الزمرة الرابعة في
الجدول الدوري

هل تعلم
أن البابليين فرشوا الجنان
المعلقة بالرصاص لاحتياط
الماء، كما أن المصريين
القداماء استخدمو الرصاص
في الزخرفة.



سبائك الرصاص والقصدير
تستخدم في لحيم
التوصيلات الكهربائية.

هل تعلم

يستعمل القصدير بصورة واسعة في طلاء الحديد والمعادن الأخرى المستعملة في صناعة علب حفظ الأغذية المعلبة كطبخ معجون الطماطة وعلب الزيوت النباتية وعلب المربيات وغيرها لحمايتها من التآكل.

مستقر. ولصعوبة فقدان أو اكتساب أربعة الكترونات فإن عناصر هذه الزمرة تميل إلى المشاركة بأربعة الكترونات عن طريق تكوين أواصر تساهمية لتعطي حالة تاكسد رباعية للعنصر (+4). وفي الحقيقة فإن مركبات السليكون والكاربون هي مركبات تساهمية ذات حالة تاكسد رباعية، بينما الجermanيوم والقصدير والرصاص فأنها تكون مركبات تساهمية وأيونية معاً، حيث أن في المركبات الأيونية يتم فقدان إلكتروني فقط لتكوين (Ge^{2+}) و (Sn^{2+}) و (Pb^{2+}) ، وأن لعناصر هذه الزمرة سواء منها ذات الصفات الفلزية أو ذات الصفات اللافلزية فعالية ضعيفة، فهي تتفاعل مع اللافلزات مثل الأوكسجين ولكنها تحتاج إلى حرارة لإتمامها.


Silicon

5 - 3 السليكون

الرمز الكيميائي : Si

العدد الذري : 14

عدد الكتلة : 28



الشكل (5 - 2)

رسم الترتيب الإلكتروني لذرة السليكون.

الترتيب الإلكتروني

رقم الغلاف (n)	رمز الغلاف	عدد الإلكترونات
1	K	2
2	L	8
3	M	4

يبين الشكل (5 - 2) الترتيب الإلكتروني لعنصر السليكون حيث يظهر أنه يحتوي على أربعة الكترونات في غلافه الخارجي، وبما أنه من الصعب على العنصر أن يفقد أربعة الكترونات أو يكتسبها لذلك يشارك فيها فتكون اغلب مركبات السليكون تساهمية، ويكون تكافؤه رباعياً.

٥ - ٣ - ١ وجوده

يعتبر السليكون العنصر الأكثر انتشاراً في قشرة الأرض بعد الأوكسجين، حيث يشكل أكثر من ربع القشرة الأرضية بنسبة تصل إلى 28%， حيث غالباً ما يكون متحداً مع الأوكسجين في التربة أو على شكل تربات طينية ورملية. ولا يوجد السليكون بصورة حرة في الطبيعة ولكنه يوجد في الصخور على هيئة ثنائي أوكسيد السليكون (SiO_2) ويدخل في تركيب مختلف السليكات وعلى شكل الكوارتز والرمل. وللسليكون كما مبين في الشكل (٥ - ٣) صورتين أحدهما متبلورة وفيها يكون لون المسحوقبني غامق والآخر غير متبلورة وفيها يكون لون مسحوقه رصاصي غامق، المتبلاة منه أقل فعالية وكلتا الصورتين لهما التركيب نفسه.



أ - غير متبلور ب - متبلور

الشكل (٥ - ٣)
صور عنصر السليكون.



العالم برزليوس

٥ - ٣ - ٢ تحضيره

أ - تحضيره مختبرياً


يحضر السليكون غير المتبلور بتتسخين عنصر البوتاسيوم في جو من رباعي فلوريد السليكون SiF_4 وفق المعادلة:



بينما يحضر السليكون المتبلور باذابة السليكون في منصهر الألمنيوم ثم تبريد محلول حيث تنفصل بلورات السليكون عن محلول.

ب - تحضيره صناعياً


يحضر السليكون صناعياً باختزال السليكا (SiO_2) بدرجات حرارة عالية وباستخدام الكاربون أو المغnesiaium كعامل مختزل [الشكل (٤ - ٤)]. كما في المعادلة الآتية:



هل تعلم


حضر السليكون لأول مرة من قبل العالم برزليوس (Berzelius) عام 1823م من تفاعل رباعي فلوريد السليكون مع البوتاسيوم حيث حصل على السليكون غير البلوري. أما السليكون البلوري فحضر لأول مرة من قبل العالم ديفايل (Deville) عام 1854م من التحلل الكهربائي للكلوريد الصوديوم والألمنيوم غير النقي الحاوي على نحو 10% سليكون. وفي بداية القرن العشرين 1907م اكتشف العالم بوتر (Pottr) طريقة تحضير السليكون من تفاعل السليكا مع الكاربون والتي أصبحت الطريقة التجارية المعتمدة في الوقت الحاضر.

ان السليكون الناتج بهذه الطريقة يحتوي على بعض الشوائب، بحيث تترواح نسبة السليكون فيه من 90 الى 95 % ويسمى بالسليكون الصناعي. يستخدم هذا النوع من السليكون في صناعة سبائك البرونز والحديد (Steel) وخاصة الحديد المطاوع وفي تحضير السليكونات (Silicones).



الشكل (4 - 5)
تحضير السليكون صناعياً.

إن هذا النوع من السليكون المنتج ذو نقاوة لا تكفي للاستخدام في صناعة كل من أشباه الموصلات أو الرقائق الدقيقة (microchips) أو الخلايا الشمسية. لذلك فإنه ينقى بتحويل السليكون أعلى إلى رباعي كلوريد السليكون أولاً ثم يختزل مرة ثانية إلى السليكون بأحد العوامل المختزلة مثل المغنيسيوم وكما يأتي :



الشكل (5 - 5)
طريقة منطقة التكرير
لتحضير السليكون عالي
النقاوة.



حيث من السهل إزالة (MgCl_2) من السليكون وذلك بغسله بالماء الحار حيث يذوب (MgCl_2) ولا يذوب السليكون، وللحصول على سليكون أعلى نقاوة تستخدم عملية أخرى لزيادة النقاوة تسمى طريقة منطقة التكرير [الشكل (5 - 5)]. في هذه الطريقة يعمل السليكون على شكل قالب اسطواني ثم

يسخن من أحدى نهاياته بوساطة مصدر حراري حلقى متحرك، هذا يؤدي إلى تكوين طبقة خفيفة من السليكون المنصهر، وعند سحب المصدر الحراري إلى الخلف تدريجياً يؤدي إلى تحرك المنصهر إلى الخلف فتنفصل الشوائب عن منصهر السليكون وتبقى في الطرف بعيد عن المصدر الحراري، مما يؤدي في النهاية إلى تركيز الشوائب في النهاية الأخرى من قالب الاسطوانى حيث يمكن قطعها والتخلص منها، بينما تكون النهاية الأمامية نقية جداً. يسمى السليكون المنتج بهذه الطريقة بالسليكون عالي النقاوة.



السليكون عالي النقاوة.

٥ - ٣ - خواص السليكون

أ - الخواص الفيزيائية

يعد السليكون من أشباه الفلزات، وهو عنصر صلب جداً، له درجة انصهار عالية (1410°C) ولمظهره بريق معدني، وهو شبه موصل للتيار الكهربائي، ويستفاد من هذه الخاصية في صناعة الأجهزة والدوائر الكهربائية والحواسيب الالكترونية، وكذلك في صناعة الخلايا الشمسية التي تحول ضوء الشمس إلى تيار كهربائي.

ب - الخواص الكيميائية

يكون السليكون خاماً تجاه معظم الحوامض، ويذوب في المحاليل المائية للقواعد من خلال التفاعل التالي:



هل تعلم


ان وادي السليكون يمثل اليوم العاصمة التقنية للكرة الأرضية بفضل عدة الآلاف من الشركات العاملة في مجال التقنيات المتقدمة التي تتخذ من هذه العاصمة البقعة الجغرافية مركزاً لمقراتها الرئيسية. جغرافياً يشغل وادي السليكون القسم الجنوبي من حوض سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. وتعود جذور استيطان الشركات التقنية في هذه المنطقة إلى مطلع القرن العشرين إلا أن نهضتها الحقيقة بدأت بعد اختراع الترانزistor المصنوع من السليكون في الخمسينيات لتشهد في مطلع الثمانينيات انفجاراً حقيقياً في حجم الاستثمارات.

ويكون السليكون فعالاً جداً تجاه الكلور وكما في المعادلة الآتية:



ولا يتأثر السليكون بالهواء عند درجات الحرارة الاعتيادية، إلا أنه يتفاعل عند (950°C). والسلikon ومركباته الطبيعية (السليكا والسليكات) غير سامة.

٤ - ٣ - ٥ استعمال السليكون



الشكل (٦ - ٥)
استخدام السليكون في
صناعة الدوائر المتكاملة.

للسليكون استخدامات واسعة منها :-

- ١- في الصناعة الالكترونية لصناعة الدوائر المتكاملة وفي الخلايا الشمسية، [لاحظ الشكل (٥ - ٦)].
- ٢- في السبايك التي تستخدم في صناعات مختلفة .
- ٣- في صناعة الزجاج والسمن والسيراميك .
- ٤- في صناعة المواد السليكونية العضوية ذات الأهمية التجارية الكبيرة ومنها الزيوت والبلاستيك.

٤ - ٣ - ٥ مركبات السليكون



هناك عدد كبير من المركبات التي يكونها السليكون،
نذكر منها :

أ - مركبات السليكون مع الهيدروجين (هيدridesات السليكون)

وهي مركبات تتكون من السليكون والهيدروجين، منها SiH_4 ويحضر هذا المركب من تفاعل سليسيد المغنيسيوم Mg_2Si مع الحواضن المعدنية كحامض الهيدروكلوريك وفق المعادلة الآتية:



والهيدridesات مركبات فعالة جدا، فمثلاً يشتعل (SiH_4) تلقائياً في الهواء لتكوين ثنائي اوكسيد السليكون والماء وفق المعادلة الكيميائية الآتية:



ب - مركبات السليكون مع الأوكسجين



الشكل (٨ - ٥)
الرمل احد اشكال السليكا
غير النقية.

١ - ثنائي اوكسيد السليكون (السليكا):

وتوجد في الطبيعة على شكل سليكا نقيّة مثل حجر الصوان والكوارتز [الشكل (٥ - ٧)]، وهي مواد شديدة الصلادة تستعمل في قطع الزجاج وتحديش الحديد الصلب. وسليكا غير نقيّة مثل الرمل [الشكل (٥ - ٨)] التي تحتوي على كميات متفاوتة من الشوائب التي تكسبها ألواناً مختلفة.

وللسليكا خواص أهمها:

أ - غير فعالة، لا تتفاعل عند تعرضها للكلور أو البروم أو الهيدروجين ومعظم الحواضن.

ب - تتفاعل مع حامض الهيدروفلوريك والقواعد :



سداسي فلوريد السيلان



ج - لها القابلية على التفاعل مع الاكسيدات أو الكarbonات الفلزية بالتسخين الشديد، حيث تتكون مركبات تعرف بالسليلات.

د - إضافة الحواضن إلى محليل سليكات الفلزات القلوية يعطي السليكا المائية، التي يمكن تجفيفها إلى مسحوق غير بلوري يسمى جل السليكا (Silica Gel) [الشكل (5 - 9)]، حيث يستعمل بصورة رئيسية كعامل مجفف وذلك لمساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية لامتصاص الماء.



الشكل (5 - 9)
السليكا جل كعامل مجفف.

2 - السليكات Silicates

تنشر السليكات بصورة واسعة في الطبيعة، وتكون مع الأوكسجين حوالي 74% من القشرة الأرضية ويظهران كسليلات للعناصر ذات الوفرة على سطح الكره الأرضية [الشكل (5 - 10)]، مثل سليقات الكالسيوم (CaSiO_3) وسليلات الصوديوم (Na_2SiO_3). اللتان تحضران من تفاعل اوكسيد أو كاربونات الفلز مع السليكا بالتسخين الشديد، كما في المعادلتين الآتيتين :



الشكل (10 - 5)
الطين أحد اشكال السليكات الطبيعية.

إن أكثر أنواع السليكات شيوعا واستعمالا هي سليقات الصوديوم القابلة للذوبان في الماء والتي محلولها المائي



الشكل (5 - 11)
بنية كاربيد السليكون.

هل تعلم

الجل الهوائي(Aerogels): وهو من المواد المصنعة الجديدة ذات الكثافة القليلة وتتكون من 90% ثانوي اوكسيد السليكون و 90% هواء او غاز. وتتصبح هذه المادة اخف من الهواء عندما تملأ بغاز الهيليوم، وهي تمتلك صفات بصريّة وصوتية وكهربائية غير عاديّة، احد اهم استخداماتها دخولها في صناعة زجاج الشبابيك، حيث توضع السليكون الهوائية بين طبقتين من الزجاج لتحسين صفات العزل للزجاج.

المركز يدعى (ماء الزجاج) الذي يستخدم في مجالات صناعية مختلفة مثل حماية بعض الأقمشة والورق من الحرائق، واستعماله كمادة لاصقة رخيصة، وكذلك استعماله في البناء بخلطه مع السمنت لتقوية الأخير .

ج - كاربيد السليكون

ويرتبط فيه الكاربون مع السليكون بأواصر تساهمية على شكل بنية شبكية باتجاهات ثلاث حيث تحاط كل ذرة كاربون بترتيب معين بأربع ذرات سليكون والتي هي أيضاً تحاط كل منها بأربع ذرات كاربون مشابهة لبنيّة الماس [الشكل (5 - 11)]. إن هذه البنية تجعل كاربيد السليكون صلّ للغاية ويستخدم كمادة جالية كما في ورق الجام وفي حجر الكوسرة [الشكل (5 - 12)]. ولهذه الغاية يخلط مسحوقه الناعم مع الطين أو سليكات الصوديوم ويوضع في قالب ويحرق. ويحضر كاربيد السليكون من تفاعل السليكون أو اوكسيده مع الكاربون في فرن القوس الكهربائي بدرجة حرارية عالية وفق المعادلات الآتية:-



د - السليكونات Silicones

وهي مركبات عضوية للسليكون غير سامة ومستقرة على مدى واسع من درجات الحرارة. وأهمها زيوت السليكون (Silicone oil) التي تتصف بأنها تضفي على السطوح طبيعة مانعة للالتصاق او مضادة للرطوبة مثل سطوح الأنسجة والبنيات. ومطاط السليكون (Silicone Rubber) يتصرف بأنه أكثر استقراراً حرارياً من المطاط الهيدروكاربوني ويبقى مرنًا في مدى واسع من درجات الحرارة، ويستعمل في صناعة القوالب وفي الحمامات والمطابخ كمواد أحكام. والراتنجات السليكونية (Silicone Resin) التي تستخدم في صناعة مواد عازلة كهربائياً وفي جعل مواد البناء مضادة للماء أيضاً.



الشكل (5 - 12)
حجر كوسرة.

أسئلة الفصل الخامس

6.5 اكمل الفراغات الآتية :

- 1- يوجد ثنائي اوكسيد السليكون (السليكا) في الطبيعة على نوعين ، نوع نقى مثل و و نوع غير نقى مثل
- 2- يمكن تحضير من التسخين الشديد للسليكا مع كاربونات فلزية او اوكسيد فلزى.
- 3- ان لعناصر الزمرة الرابعة حالات التاكسد الشائعة و
- 4- ان الحالة التاكسدية تكون مستقرة في الكاربون والسلikon .
- 5- يتفاعل السليكون عند تسخينه الى 950°C مع الاوكسجين او الهواء الجوى ليعطى
6- تزداد الصفات كلما انتقلنا من اعلى الزمرة الى اسفلها وتقل كذلك بالانتقال من اعلى الى اسفل الزمرة .
- 7- للسلikon صورتين احدهما وفيها يكون لون مسحوقه والآخرى وفيها يكون لون مسحوقه
.....

1.5 اكتب معادلات موزونة لكل مما ياتي :

- 1 - تفاعل المغنيسيوم مع ثنائي اوكسيد السليكون .
- 2 - معادلة اختزال ثنائي اوكسيد السليكون بواسطة الكاربون .
- 3 - تفاعل سليسي المغنيسيوم مع حامض الهيدروكلوريك.
- 4 - تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع كاربونات الكالسيوم .
- 5 - تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع فلوريد الهيدروجين (حامض الهيدروفلوريك).
- 6 - تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع هيدروكسيد الكالسيوم
- 7 - تفاعل ثنائي اوكسيد السليكون مع كاربونات الصوديوم .
- 8 - تفاعل السليكون مع الكاربون .

2.5 اكتب الترتيب الالكتروني للعنصر

الاتي :



3.5 ما هو السليكون العالى النقاوة وكيف يحضر .


4.5 اشرح مع كتابة المعادلات الكيميائية طرائق تحضير السليكون .

5.5 عدد ستة استعمالات متنوعة لعنصر السليكون ومركباته .

الفصل السادس

6

مدخل في الكيمياء العضوية



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على أن :

- يدرك أهمية المركبات العضوية .
- يعرف مميزات او صفات المركبات العضوية.
- يربط الكيمياء العضوية بمحیطه وبيئته.
- يميز بين غاز الميثان والاثيلين والاستيلين.
- يحضر غاز الميثان والاثيلين والاستيلين ويفهم خواص كل منها.

٦ - ١ مقدمة

سبق لك ان درست في كيمياء الثاني المتوسط بشيء من التفصيل؛ عنصر الكاربون وبعض مركباته المهمة في حياتنا (مثل ثنائي اوكسيد الكاربون وكarbonات الكالسيوم). ودرست في الفصل السابق من هذا الكتاب الزمرة الرابعة IVA التي تضم العناصر C و Si و Ge و، وتواصلاً للتوسيع الافقي والعمودي في علم الكيمياء بما ينسجم تربوياً مع التطور العلمي الحديث ونظراً لما لعنصر الكربون من صفات فريدة (قلمانجدها في بقية العناصر) ولكونه العنصر الرئيس والاساس الذي يدخل في تكوين جزيئات الكائنات الحية واغذيتها، كما يساهم في شتى مجالات متطلبات حياتنا المعاصرة (من ادوية وعطور واصباغ و ... الخ) فيما اصبحنا نعرفه اليوم بالكيمياء العضوية؛ فسنطرق في هذا الفصل لدراسة مبادئ هذا الفرع الرئيس في علم الكيمياء، ونقصد به (الكيمياء العضوية) بشيء من التفصيل البسيط للخواص العامة وبعض المركبات العضوية البسيطة مثل غازات الميثان والايثان والاستيلين وكذلك كحول الاشيل والبنزين وحامض الخليك والفينول.



٦ - ٢ أهمية المركبات العضوية

تعتبر المركبات العضوية مهمة جداً في حياتنا من خلال انها تتمثل في:



١- كل اصناف المواد الغذائية الرئيسية للانسان والحيوان وهي البروتينات والكاربوهيدرات والزيوت والشحوم النباتية والحيوانية.

٢- كثير من المنتوجات الطبيعية والصناعية كالقطن والصوف والحرير الطبيعي والصناعي والورق والبلاستيك.

٣- اصناف الوقود مثل النفط والغاز الطبيعي والخشب.

٤- العقاقير الطبية وكذلك الفيتامينات والهرمونات والانزيمات.

تدخل المركبات العضوية في صناعة الكثير من المواد المهمة في حياتنا اليومية.

6 - 3 وجود الكاربون في المركبات العضوية



ان اساس تركيب المركب العضوي هو عنصر الكاربون ولا ثبات وجوده في المركبات العضوية يمكن اجراء التجارب الآتية:

- عند اشعال شمعة او قطعة من الورق او (اي مادة عضوية) يتحرر غاز ثنائي اوكسيد الكاربون CO_2 الذي يمكن الكشف عنه بامراره على محلول هيدروكسيد الكالسيوم (ماء الجير) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ فيعكره حيث تتكون كarbonات الكالسيوم CaCO_3 .
- عند حرق كمية من السكر وهو مادة عضوية فيانبوبة اختبار نلاحظ تخلف مادة سوداء هي الكاربون وهذا يدل على ان الكاربون يدخل في تركيب السكر.

تمرين (6 - 1)

كيف تبرهن على وجود الكاربون في المركبات العضوية؟

6 - 4 صفات المركبات العضوية

تمتاز المركبات العضوية بصورة عامة بما يأتي:



- كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها وهي قابلة للاحتراق أو التحلل بالتسخين ولا سيما اذا تم تسخينها لدرجة حرارة عالية.
- غالبا ما ترتبط الذرات في المركبات العضوية باواصر تساهمية تجعلها تتفاعل بشكل بطيء.
- الكثير من المركبات العضوية لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في بعض السوائل العضوية كالكحول والايثر والاسيتون ورباعي كلوريدي الكاربون.....

6 - 5 الاواصر التساهمية لذرات الكاربون في المركبات العضوية

يمتلك الكاربون عدد ذري مقداره 6 لذلك يمكن رسم ترتيبه الالكتروني حسب الشكل (6 - 1). يلاحظ ان الغلاف الخارجي (غلاف التكافؤ) لذرة الكاربون يحتوي اربعة كترونات. لذلك ولكي تصل ذرة الكاربون الى حالة الاستقرار، لابد لها ان تشارك بالكترونات تكافؤها الاربعة مع ذرات اخرى، بحيث يصبح

عدد الالكترونات المحيطة بكل ذرة كاربون ثمانية الالكترونات.
وكما تعلمت ان كل اصرة تساهمية تحتاج الى الالكترونين (الكترون من كل ذرة)، لذا ترتبط ذرات الكاربون وعلى الصورة التالية باربع اواصر تساهمية مفردة مع الهيدروجين



في جزيء الميثان : CH_4



الشكل (1 - 6)
رسم الترتيب الالكتروني
لذرة الكاربون.



ميثان (اربع اواصر تساهمية مفردة)

وقد ترتبط ذرتا الكاربون مع بعضهما باواصر تساهمية مزدوجة كما في جزيء الاثيلين :



اثيلين (اصرة تساهمية مزدوجة واربع اواصر تساهمية مفردة)


كما وقد ترتبط ذرتا الكاربون ايضاً مع بعضها باواصر تساهمية ثلاثية كما في جزيء الاستيلين :




استيلين (اصرة تساهمية ثلاثية واصرتين تساهميتيين مفردتين)

ان هذه الاحتمالات المختلفة لترابط ذرة الكاربون في مركباتها، والتي تظهر قدرة هذه الذرة على تكوين اواصر تساهمية مختلفة، اضف الى ذلك قدرة ذرات الكاربون على


الارتباط بعضها ببعض لتكوين سلاسل مفتوحة او مغلقة (حلقات)، وتتضمن هذه السلاسل روابط تساهمية مفردة او مزدوجة او ثلاثية بين ذرات الكربون او ذرات اخرى. لذا فهناك مئات الالاف من المركبات العضوية الموجودة في الطبيعة والتي يمكن تحضيرها ايضاً.
والامثلة التالية توضح مركبات عضوية باشكال مختلفة.




مركب عضوي (سلسلة متفرعة)
(ايزوبوتان)




مركب عضوي (سلسلة مستمرة)
(بيوتان)




مركب عضوي باصرة تساهمية مفردة
(ميثان)




مركب عضوي يحتوي على الاوكسجين
(كحول الايثيل)




مركب عضوي باصرة تساهمية ثلاثية
(استيلين)




مركب عضوي باصرة تساهمية مزدوجة
(اثيلين)



مركب عضوي حلقي ثلاثي الشكل
(بروبان حلقي)



مركب عضوي حلقي خماسي الشكل
(بنتان حلقي)



مركب عضوي حلقي سداسي الشكل
(هكسان حلقي)

وسندرس في هذا الفصل عدة انواع من هذه المركبات العضوية، ثلات منها هيدروكاربونية اي تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط، وهي غازات ميثان CH_4 واثيلين C_2H_4 واستيلين C_2H_2 ، حيث يمثل الميثان مثال عن المركبات العضوية التي تحتوي في تركيبها على اواصر تساهمية مفردة يسمى هذا النوع

من المركبات بالهيدروكاربونات المشبعة التي يطلق عليها اسم الالكانات. اما جزء الايثيلين C_2H_4 فيحتوي على اصارة تساهمية مزدوجة بين ذرتى الكاربون وهذه المركبات تسمى بالالكينات. بينما يحتوى الاستيلين على اصارة تساهمية ثلاثية بين ذرتا الكاربون، ويطلق على هذه المركبات اسم الالكايئنات وكلاهما اي الايثيلين والاستيلين يسميان بالهيدروكاربونات غير المشبعة.

اما الانواع الاخري التي سندرسها في هذا الفصل فهي تمثل مركبات عضوية ترتبط ذرة الكاربون فيها اضافة للهيدروجين مع الاوكسجين، حيث سندرس مركب كحول الايثيل C_2H_5OH وحامض الخلiek CH_3COOH . اضافة الى ذلك سنتطرق الى دراسة مركبى البنزين والفينول اللذان هما مثال على المركبات العضوية الحلقة المغلقة.

6 - 6 بعض المركبات العضوية

سنتطرق في هذه المرحلة الى دراسة مبسطة لبعض المركبات العضوية مثل الهيدروكاربونات المشبعة وغير المشبعة والكحولات والحوامض.

6 - 1 الهيدروكاربونات

الهيدروكاربون كما هو موضح من اسمه مركب يتكون من الكاربون والهيدروجين فقط ويكون اما مشبع او غير مشبع ومن أمثلة الهيدروكاربونات.

1 - غاز الميثان CH_4


صيغته الجزيئية CH_4 حيث ترتبط ذرة الكاربون فيه مع 4 ذرات من الهيدروجين باواصر تساهمية منفردة.

أ - وجود الميثان

هو ابسط مركب هايدروكاربوني يوجد بنسبة كبيرة في الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام أو ينبعث من بعض شقوق مناجم الفحم وكذلك يتكون نتيجة تحلل المواد العضوية في مياه البرك والمستنقعات الراكدة.

هل تعلم



ان غاز الميثان يسمى بغاز المستنقعات والمناجم حيث يتجمع بصورة مستمرة في مناجم الفحم ويشكل خطراً كبيراً بسبب سرعة احتراقه.



جزء الميثان.

ب - تحضير غاز الميثان

يحضر غاز الميثان باستخدام الجهاز المبين في الشكل (6 - 2) حيث تسخن خلات الصوديوم تسخيناً شديداً مع هيدروكسيد الصوديوم واوكسيد أو هيدروكسيد الكالسيوم (لان الخليط يكون اقل تأثيراً على الزجاج واعلى درجة انصهار من هيدروكسيد الصوديوم) في انبوبة اختبار مناسبة ويجمع الغاز الناتج بازاحة الماء الى الاسفل.



الشكل (6 - 2)
جهاز تحضير غاز الميثان.

ج - خواص غاز الميثان

1. عديم اللون والرائحة.
2. قليل الذوبان جداً في الماء
3. قابل للاشتعال وبلهب غير داخن مكوناً غاز ثانوي اوكسيد الكاربون CO_2 وبخار الماء H_2O محرراً طاقة وكما في المعادلة الآتية:





ـ 2 - الايثيلين C_2H_4

يملك صيغة جزيئية C_2H_4 حيث ترتبط ذرتا الكاربون فيه مع بعضهما باصرة تساهمية مزدوجة. وهو من صنف


الهيدروكربونات غير المشبعة التي تسمى بالالكينات.

أ - تحضير الاثيلين:

يحضر هذا الغاز من تسخين كحول الايثيل C_2H_5OH مع كمية كافية من حامض الكبريتيك المركزى حوالي (170 °C) كما مبين في الشكل (6 - 3) حيث يقوم حامض الكبريتيك بانتزاع جزء الماء من تركيب الكحول كما في المعادلة الآتية:



جزء الاشيلين.




ب - خواص الاثيلين

الشكل (6 - 3)

- 1 - غاز عديم اللون لا يذوب في الماء.
 - 2 - يشتعل بلهب داخن مكوناً ثنائياً أوكسيد الكاربون وماء.



- 3- يتفاعل مع ماء الباروم الاخضر ويزييل لونه وتعتبر هذه



طريقة للتمييز بينه وبين غاز الميثان حيث ان الميثان لا يتفاعل مع ماء البروم الاحمر ولا يختفي اللون، اما الايثيلين فيتفاعل مع ماء البروم الاحمر ويختفي اللون وحسب المعادلات اللفظية الآتية:



ج - استعمالات الايثيلين

استخدام غاز الايثيلين في
انضاج الطماطم.

- 1 - يستعمل هذا الغاز كمادة أولية في تحضير مادة الدائن (البلاستيك) المستعملة في تصنيع الكثير من المواد والادوات المستخدمة في الحياة اليومية.
- 2 - يستخدم الغاز في انضاج الكثير من الخضروات والفاكه.
- 3 - يستخدم في صناعة كحول الايثيل.

3 - الاستيلين C_2H_2


مركب هيدروكربوني صيغته الجزيئية C_2H_2 ، ترتبط ذرتا الكاربون فيه باصرة تساهمية ثلاثية وهو مثال على صنف الهايدروكربونات غير المشبعة تسمى الالكايونات.

أ - تحضيره :


يحضر الاستيلين في المختبر من تفاعل كاربيد الكالسيوم CaC_2 مع الماء وهذه طريقة صناعية في الوقت نفسه.



يحضر غاز الاستيلين في المختبر كما في الجهاز المبين في الشكل (6 - 4) حيث يوضع كاربيد الكالسيوم في دورق التحضير ويضاف اليه الماء من خلال الانبوب الممكع ببطء وبصورة تدريجية تلاحظ حدوث تفاعل وخروج غاز الاستيلين الذي يجمع من القنية بازاحة الماء الى الاسفل.



جزيء الاستيلين.



الشكل (٤ - ٦)

جهاز تحضير غاز الاستيلين.

ب - خواص الاستيلين

- 1 - غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم.
- 2 - لا يذوب في الماء.
- 3 - يشتعل في الهواء بلهب داخن فيما يشتعل في الاوكسجين بلهب ازرق باهت مع تولد حرارة عالية كما في المعادلة:



- 4 - يتفاعل مع ماء البروم الاحمر ويزييل لونه ويعود هذا التفاعل طريقة للتمييز بين الاستيلين وغاز الميثان حيث يزييل الاستيلين اللون الاحمر لماء البروم ولا يؤثر فيه غاز الميثان حسب المعادلات اللغوية الآتية:



ج - استعمالات الاستيلين

- 1 - يستعمل مزيج الغاز الاوكسجين في توليد الشعلة المسماة بالشعلة الاوكسي استيلينية التي تستخدم في قطع المعادن أو لحمها.




الشعلة الاوكسي استيلينية.

2- يستعمل الغاز كمادة اولية في صناعة انواع من المطاط والبلاستيك وحامض الخليك.


4- كحول الايثيل (الايتانول) C_2H_5OH

الكحول كلمة عربية (منها اشتق اسمها اللاتيني Alcohol) وهو مادة معروفة منذ امد طويل وكان يحضر من تخمير الدبس او التمر او عصير العنب بمعزل عن الهواء حيث يتتحول السكر بفعل انزيم الخميرة الى سكر بسيط ثم يتتحول السكر البسيط بفعل انزيم الزايميز الى كحول الايثيل وثنائي اوكسيد الكاربون

انزيم الزايميز



ثم يفصل الكحول من محلوله المائي بالتقطرير ، ويحضر كحول الايثيل صناعياً من مشتقات النفط بتفاعل غاز الايثيلين (C_2H_4) مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المركز وعوامل مساعدة اخرى (درجة حرارة وضغط).



a - خواص كحول الايثيل

- 1- سائل له درجة غليان اقل من درجة غليان الماء ويتجسد في درجة حرارة واطئة.
- 2- سائل ذو رائحة مميزة.
- 3- مذيب جيد للكثير من المواد العضوية.
- 4- يشتعل بلهب ازدق باهت مكوناً CO وبخار الماء.

b - استعمالات كحول الايثيل

- 1- يستعمل كحول الايثيل كمادة اولية في الكثير من الصناعات ولاسيما مواد التجميل والعطور وانواع الوارنيش والحرير والمطاط الصناعي.

2 - يستعمل في كثير من المركبات الدوائية والمشروبات الروحية.

3 - استعماله كوقود وذلك بخلطه مع مشتقات نفطية أخرى.

4 - يخلط مع قليل من اليود ليكون محلول يستخدم لتعقيم الجروح وهو سام.

5-يباع كحول الايثيل بثمن رخيص للاغراض الصناعية ويعطل عن الشرب ويعرف عندئذ بالكحول المعطل (السبيرتو) ويتم ذلك باضافة بعض المواد السامة اليه مثل كحول المثليل وبعض الاصباغ لغرض تمييزه عن كحول الايثيل النقي.

ج - تأثير كحول الايثيل على الانسان

ان شرب الكحول يعمل على عدم ترابط عمل الجهاز العصلي مع الجهاز العصبي حيث تحصل تغيرات واضحة في الشعور والمزاج والادراك الحسي. واثر هذه التغييرات الناتجة عن تاثر الجسم بالكحول يؤدي الى ابطاء عمل خلايا الجهاز العصبي والادمان على شربه مضر جداً بصحة الانسان لذلك يتعدد المدمنون على الكحول على عيادات الاطباء والمستشفيات لكثرة الامراض التي يجلبها علاوة على الاضرار الاجتماعية والسلوك الخاطئ الذي يقتربه مدمنو الكحول وتفرض بعض الحكومات ضرائب عالية للتقليل من استعماله كمشروب والتخفيف من اضراره الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

5 - حامض الخليك CH_3COOH

أ - تحضيره صناعيا :

يحضر حامض الخليك صناعيا على نطاق واسع من تفاعل الاستيلين مع الماء بوجود حامض الكبريتيك وعوامل مساعدة اخرى حيث تجري سلسلة من التفاعلات تؤدي الى تكوين حامض الخليك.

ب - خواص حامض الخليك

1 - سائل في درجات الحرارة الاعتيادية الا انه يتجمد

في (18°C) إلى ما يشبه الثلج.

2- ذو رائحة نفاذة.

3 - يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم مكوناً ملح خلات الصوديوم الذائبة في الماء.

4 - يمتزج بالماء بآلية نسبة كانت.

6- البنزين أو البنزول C_6H_6

يمكن الحصول على البنزول من قطران الفحم الذي هو أحد مشتقات البترول وهو سائل سريع التبخر. والبنزين مركب هيدروكربوني مكون من كARBون وهيدروجين ويشتعل بلهب داخن جداً لاحتوائه على نسبة كARBون عالية. ويعتبر البنزين أبسط مركب لسلسلة الهيدروكربونات التي تدعى بـ(الهيدروكربونات العطرية (الاروماتية)) نظراً لتميز افراد هذه السلسلة بروائح خاصة. البنزول سائل سريع التبخر يغلي في (80°C) ولا يذوب في الماء وبخاره سام ويستعمل كمذيب للاصباغ والوارنيش ولكثير من المشتقات المهمة صناعياً وفي إنتاج المواد المبيدة للحشرات وفي صناعة النايلون ومساحيق التنظيف الحديثة وغير ذلك.

هل تعلم

يعتبر حامض السلسليك هو أحد الفينولات الذي يستخرج من شجرة الصفصاف ويحضر منه الاسبرين.

7- الفينول C_6H_5OH

الفينول النقي مادة صلبة عديم اللون ذات رائحة خاصة ومختلفة للجلد فان سقط على الجلد سبب له حروق مؤلمة ويمكن معالجة هذه الحروق حال حدوثها بغسلها بمحلول مخفف لكاربونات الصوديوم لمعادلة تأثير الفينول. يذوب الفينول في الماء ويستعمل محلوله (%) لتعقيم المرافق الصحية تحت اسم حامض الكاربوليک. الفينول مادة فعالة كيميائياً يمكن الحصول منها على مشتقات مهمة كالمعقمات والمطهرات ومساحيق التنظيف الحديثة ومبيدات الحشرات والبلاستيكات.

أسئلة الفصل السادس

3- تسخين خليط من كحول الاثيل وحامض الكبريتيك المركز الى (170 °C).

4- تفاعل الماء مع كاربيد الكالسيوم.

7.6 اشرح تأثير الكحول الاعتيادي (كحول الاثيل) على جسم الانسان بعد تناوله كمشروب روحى.

8.6 ما المقصود بالكحول المعطل (السيبرتو).

9.6

أ- قارن بين غاز الميثان وغاز الاثيلين وغاز الاستيلين من حيث:

1- اللون والرائحة

2- قابلية الذوبان في الماء

3- اشتعالها بالهواء بشكل اعتيادي

4- تفاعلها مع ماء البروم الاحمر اللون

ب- ماذما يستخدم مع غاز الاستيلين لانتاج الشعلة القوية؟

10.6 ما هي اهمية كل من البنزول والفينول؟

11.6 بين صفة غاز الميثان CH_4 التي تعكسها كل من الملاحظات الآتية:

أ- ان الغاز يتجمع عند تحضيره بازاحة الماء الى الاسفل.

ب- ان الغاز لا يتفاعل مع البروم.

ج- ان الغاز يشتعل بلهب ازرق فاتح غير داخن.

12.6 يشتعل كل من الاستيلين والبنزين بلهب داخن، ماذما تستدل من هذه الملاحظة؟

1.6 وضع مع الرسم جهاز تحضير غاز الميثان في المختبر معززاً جوابك بكتابه المعادلة الكيميائية؟

2.6 اعط مثلاً لكل مما يأتي:

سلسلة كARBONIC مستمرة - سلسلة CARBONIC حلقة - سلسلة CARBONIC متفرعة.

3.6 اختر الانسب من بين القوسين الذي يكمل التعبير الآتية:

أ- كل المركبات العضوية تحتوي على احد العناصر الاتية في تركيبها (الهيدروجين ، الاوكسجين ، النتروجين ، الكبريت ، الكاربون)

ب- يكون الارتباط بين ذرتي الكاربون في المركب المشبع بأواصر تساهمية (مفردة ، مزدوجة ، ثلاثية).

ج- الغاز الذي نسبته الحجمية أكبر من الغازات الاخرى في الغاز الطبيعي هو (الميثان ، الاثيلين ، الاستيلين).

د- في الاستيلين C_2H_4 ترتيب ذرتا الكاربون ببعضهما (اصرة تساهمية مفردة ، اصرة مزدوجة ، اصرة ثلاثية).

4.6 وضع مع الرسم جهاز تحضير غاز الاستيلين في المختبر معززاً جوابك بالمعادلة الكيميائية.

5.6 ما اهم المميزات للمركبات العضوية؟

6.6 كيف تعبر عن كل مما يأتي بمعادلات كيميائية موزونة؟

1- تسخين خلات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم تسخيناً شديداً.

2- حرق كل من غاز الميثان والاثيلين والاستيلين في الهواء حرقاً تاماً.

الفصل السابع

7

الزمرة الخامسة

Group VA



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على أن :

- يتعرف على أسماء ورموز عناصر الزمرة الخامسة VA.
- يحدد موقع عناصر الزمرة الخامسة في الجدول الدوري.
- يدرك لماذا جمعت هذه العناصر بزمورة واحدة.
- يستوعب اسم ورمز غاز النتروجين وصيغته الجزيئية في الهواء.
- يتعرف على بعض مركبات النتروجين وطريقة تحضيرها وأهم استعمالاتها.
- يستوعب اسم ورمز عنصر الفسفور ويميز بين صورتيه فيزيائياً وكيميائياً.
- يدرك أهمية الأسمدة الفوسفاتية وكيفية الحصول عليها ودورها في نمو النباتات.

7 - 1 عناصر الزمرة الخامسة VA

تتألف عناصر هذه الزمرة من عنصر النتروجين (N) والفسفور (P) والزرنيخ (As) والانتيمون (Sb) والبزموت (Bi) كما مبين موقعها في الجدول الدوري للعناصر [الشكل (7 - 1)]. تشتراك هذه العناصر جميعها بامتلاكها لخمسة الكترونات في غلاف الطاقة الخارجي.



IA		VIIIA																	
1 H	2 He																		
3 Li	4 Be																		
11 Na	12 Mg	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIIB	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IIB	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar		
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr		
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe		
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn		
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub								

7 - 2 الصفات العامة للزمرة الخامسة VA

على الرغم من أن العناصر الخمسة لهذه الزمرة تشكل معاً نسبة تقل عن 0.2% من حيث الوزن في القشرة الأرضية، إلا أنها تكتسب أهمية كبيرة. تتشابه عناصر هذه الزمرة في بعض السلوك الكيميائي العام، لكنها تختلف في البعض الآخر. وأوجه التشابه هذه تعكس السمات المشتركة للترتيب الإلكتروني لعناصرها. واهم الصفات العامة لهذه الزمرة:

- 1- تتدرج صفات عناصر هذه الزمرة من صفة لافلزية لعنصر النتروجين والفسفور إلى صفة فلزية لعنصر البزموت بينما يكون كل من عنصري الزرنيخ والانتيمون أشباه فلزات.

الشكل (7 - 1)
الجدول الدوري للعناصر
موقع الزمرة الخامسة
فيه.



الزرنيخ.




الانتيمون.

2 - يكون النتروجين بحالة غازية بينما تكون باقي عناصر هذه الزمرة بحالة صلبة في الظروف الاعتيادية.

تتغير الخواص الكيميائية بشكل منتظم من الفسفور إلى البزموت، ففي حين يميل الفسفور إلى تكوين مركبات تساهمية شأنه شأن النتروجين يزداد ميل باقي عناصر الزمرة إلى تكوين مركبات أيونية كالزرنيخ والبزموت، وكذلك تتغير الخواص الحامضية والقاعدية لકاسيدها من حامضية للفسفور إلى قاعدية للبزموت.

Nitrogen

7 - 3 النتروجين



الرمز الكيميائي : N

العدد الذري : 7

عدد الكتلة : 14

الترتيب الإلكتروني

رسم الترتيب الإلكتروني
لذرة النتروجين.

رقم الغلاف	عدد الالكترونات	الرمز
1	2	K
2	5	L

7 - 3 - 1 وجوده



يشكل النتروجين حوالي 78% من حجم الغلاف الجوي وهو عنصر غير فعال تقريباً في الظروف الاعتيادية لذلك فقد أطلق عليه قديماً اسم الأزوت والتي تعني باللغة اللاتينية (عديم الحياة)، ومع ذلك فإن لمركباته أهمية كبيرة في الأغذية والأسمدة وفي صناعة المفرقعات.

7 - 3 - 2 تحضير غاز النتروجين

يمكن تحضير غاز النتروجين مختبرياً وصناعياً وكالآتي:

١- تحضيره مختبرياً

وذلك بتسخين مزيج من ملح كلوريد الامونيوم (NH_4Cl) وملح نتريت الصوديوم (NaNO_2) بوجود كمية قليلة من الماء (لمنع حدوث انفجار) [الشكل (7 - 2)], ويمكن التعبير عن التفاعل بالمعادلتين الآتىتين:



٢- تحضيره صناعياً

يحضر غاز النتروجين صناعياً وبكميات تجارية كبيرة بعملية التقطر التجزيئي للهواء المسال الحالي من ثنائي اوكسيد الكاربون، حيث يتقطر النتروجين أولاً تاركاً الاوكسجين، وذلك لكون درجة غليانه (-198°C) أوطأ من درجة غليان الاوكسجين (-183°C). يحتوي غاز النتروجين الذي يتم الحصول عليه بهذه الطريقة على كميات ضئيلة من الاوكسجين والتي يمكن التخلص منها بإمرار الغاز فوق برادة النحاس الساخنة والتي تتفاعل مع الاوكسجين لتكون CuO .

الشكل (2 - 7)
تحضير النتروجين من
نتريت الامونيوم.

7 - 3 - 3 خواص غاز النتروجين

يتسم غاز النتروجين بالخواص الآتية:

1 - الخواص الفيزيائية

هل تعلم

ان هناك غازات ثنائية الذرة اخرى اضافة الى غاز N_2 وهي H_2 و Cl_2 و F_2 و O_2 .

غاز عديم اللون والرائحة على هيئة جزيء ثنائي الذرة (N_2) عند درجة حرارة الغرفة وهو قليل الذوبان في الماء وغير فعال تقريباً في الظروف الاعتيادية.

2 - الخواص الكيميائية

يتفاعل النتروجين تحت ظروف معينة مع عناصر أخرى، فعند تسخين النتروجين يتحد مباشرة مع المغنيسيوم والليثيوم والكالسيوم أما عند مزجه مع غاز الاوكسجين وتعرضه للمزيج إلى شرارة كهربائية فإنه ينتج اكاسيد النتروجين (NO و NO_2). ومن ناحية أخرى، فعند تسخينه مع غاز الهيدروجين تحت ضغط مرتفع وبوجود عامل مساعد مناسب فإنه ينتج الامونيا (طريقة هابر) حسب المعادلة الآتية:



7 - 3 - 4 استعمالات غاز النتروجين

لغاز النتروجين استعمالات واسعة منها

1 - يستعمل لإنتاج الامونيا صناعياً (طريقة هابر)، ويعتبر ذلك من أهم الاستعمالات لما لهذه المادة من أهمية في مجال إنتاج الأسمدة وفي إنتاج حامض النتريك (طريقة اوستولد).

2 - يستعمل في عمليات تبريد المنتجات الغذائية وذلك بعملية التجميد بالغمر في الغاز المسال.

3 - يستعمل النتروجين المسال في الصناعات النفطية وذلك لإحداث زيادة في ضغط الآبار المنتجة للنفط لجعل النفط يتدفق منها.

4 - يستعمل كجو خامل في خزانات المواد القابلة للانفجار. وهناك استعمالات كثيرة أخرى لهذا الغاز في مجالات مختلفة.

غاز النتروجين المسال.

5-3-7 بعض مركبات النتروجين

تحتوي ذرة النتروجين على خمسة الكترونات في غلافها الخارجي ولذلك يمكنها المشاركة في تكوين أواصر تساهمبية قد تكون مفردة كما في جزيء الامونيا (NH_3) أو ثلاثية كما في حالة جزيء النتروجين (N_2). أو اكتساب ثلاثة الكترونات أو اكتساب الكترون واحد، وحسب اتحادها مع ذرات العناصر الأخرى في مركباتها


ومن أهم مركبات النتروجين هي:

1- غاز الامونيا (NH_3)


هو أحد المركبات المهمة للنتروجين والهيدروجين. ينتج في الطبيعة من تحلل أجسام الحيوانات و النباتات بعد موتها، كما و توجد الامونيا في التربة على هيئة املاح الامونيوم.

أ - تحضير الامونيا مختبرياً

يحضر غاز الامونيا مختبريا بتسخين ملح كلوريد الامونيوم بلف مع هيدروكسيد الكالسيوم وحسب المعادلة الآتية:



وبما أن غاز الامونيا أخف من الهواء فإنه يجمع بالإزاحة السفلية للهواء بعد أن يمرر على عمود يحوي اوكسيد الكالسيوم للتخلص من الرطوبة المصاحبة للغاز كما في [الشكل (3-7)].



الشكل (3-7)
تحضير الامونيا مختبرياً

بـ - إنتاج الامونيا صناعياً:


يتم إنتاج الامونيا صناعياً وبكميات كبيرة بطريقة هابر [الشكل (7 - 4)] والتي تتضمن الاتحاد المباشر للنتروجين مع الهيدروجين وحسب المعادلة الآتية:



وكلما مر ذكره سابقًا




العالم فريتز هابر.



الخواص الفيزيائية للامونيا

- 1 - الامونيا غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة ولاذعة يؤدي استنشاقه إلى تدمع العين، وهو أخف من الهواء.
- 2 - كثير الذوبان في الماء، ويعرف محلوله المائي بماء الامونيا (NH_4OH)، وعند تسخين محلوله المائي أو تركه معرضًا للجو فإنه يفقد غاز الامونيا، ويمكن البرهنة على قابلية ذوبانه العالية في الماء بتجربة النافورة المبينة في الشكل (7 - 5).



الشكل (5 - 7)
نافورة غاز الامونيا

يتالف الجهاز من كأس مملوءة الى نصفها بالماء، وتحتوي قطرتين من محلول دليل الفينولفاتالين وورق دائري القطر مجهر بسداد مطاطي ذي ثقبين يخترق احدهما انبوب زجاجي طويلاً يمتد حتى قعر الدورق ويخترق الفتحة الثانية انبوب قطارة. فملا الدورق بغاز الامونيا الجاف ونقلبه فوق كأس الماء ثم ندخل بوساطة القطارة بضع قطرات من الماء المحتوى على دليل الفينولفاتالين العديم اللون وحين يصبح الغاز بتماس مع الماء يذوب فيه فيتداخل الضغط داخل الدورق ليندفع الماء من الكأس الى الدورق بشكل نافورة ويبلون محلوله بلون احمر وردي بسبب قاعديته (محلول الامونيا ذو قاعدي).

- يمكن إسالتها بسهولة عند درجة حرارة الغرفة بتسليط ضغط مقداره 8-10 atm . ولسائل الامونيا درجة غليان مقدارها (-33.5°C) تحت الضغط الجوى الاعتيادي وله حرارة تبخر كامنة عالية لذلك يستعمل في مصانع إنتاج الثلج لغرض التبريد.

الخواص الكيميائية للأمونيا


يعتبر جزيء الامونيا ثابتاً كيميائياً، ومع ذلك يتفك
لينتج النتروجين و الهيدروجين عند إمرار الغاز على
سطح فلزي ساخن أو عند إمرار شرارة كهربائية خلال الغاز.
وغاز الامونيا قابل للاشتعال في جو من الاوكسجين كما في
المعادلة الآتية:



ان محلول الامونيا يحول لون ورقة زهرة الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق.

الكشف عن الامونيا

يمكن الكشف عن الامونيا والتاكيد من وجودها عند اتحادها مع غاز كلوريد الهيدروجين حيث ينتج أبخرة بيضاء كثيفة نتيجة ل تكون غاز كلوريد الامونيوم:





٣- حامض النيتريك Nitric Acid

يعتبر حامض النتريك من أهم الحوامض الاوكسجينية للنتروجين وهو ذو صيغة جزيئية HNO_3 .

تحضير الحامض مختبرياً

يحضر هذا الحامض عادةً بتسخين مزيج مكون من ملح نترات البوتاسيوم مع حامض الكبريتيك المركز في معوجة زجاجية، ويكتف بخار حامض التريك الناتج من التفاعل في وعاء استقبال مبرد بالماء [الشكل (7 - 6)] ويمكن التعبير عن معادلة التفاعل بما يأتي:






الشكل (7 - 6)
تحضير حامض النتريك
مختبرياً.

تحضير الحامض صناعياً

يمكن تحضيره صناعياً بكميات تجارية بطريقة اوستولد والتي يتم فيها أكسدة الامونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل مساعد، كما في الشكل (7 - 7) :



العالم فريديريك وهام اوستولد.



الشكل (7 - 7)
تحضير حامض النتريك
صناعياً.




حامض النتريك المخفف.

يكون الحامض النقي عديم اللون وتنبعث منه أبخرة ذات رائحة نفاذة، ولكن لون الحامض غير النقي (أو الحامض النقي بعد تركه لفترة من الزمن) يكون أصفرًا نتيجة لاحتوائه على اكاسيد النتروجين الذائبة (خصوصاً NO_2). والحامض تام الإذابة في الماء ليكون مزيج معه (بنسبة 68%) ويغلي الحامض عند درجة حرارة (120.5°C).

7 - 4 الفسفور

Phosphorus



رسم الترتيب الإلكتروني لذرة الفسفور.

الترتيب الإلكتروني

الرمز الكيميائي : P
العدد الذري : 15
عدد الكتلة : 31

رقم الغلاف	عدد الالكترونات	رمز الغلاف
1	2	K
2	8	L
3	5	M


7 - 4 - 1 وجود الفسفور

يعتبر هذا العنصر من المكونات الأساسية في الكائنات الحية حيث يوجد في الخلايا العصبية والعظام وساتيوبلازم الخلايا. أما في الطبيعة فلا يمكن أن يتواجد بشكل حر ولكنه يتواجد بشكل واسع في معادن مختلفة حيث تعتبر الخامات الفوسفاتية (الاباتايت: شكل غير نقى لفوسفات الكالسيوم) مصدراً مهماً لهذا العنصر. وتوجد ترببات كبيرة من هذا المعادن في مناطق مختلفة من العالم ومنها العراق.


7 - 4 - 2 انتاج الفسفور صناعياً

تحتوي خامات الفسفور على نسب عالية من عنصر الفسفور ولذلك فهي تمثل المصدر الأساسي لإنتاجه بكميات تجارية وبنقاوة عالية لذلك لا توجد حاجة لتحضيره مختبرياً.

تتضمن الطريقة المعتادة لإنتاج الفسفور تسخين خام فوسفات الكالسيوم $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ الممزوج مع الرمل SiO_2 والكاربون C في فرن كهربائي لدرجات حرارية عالية وبمعزل عن الهواء كما في المعادلة الآتية:



إن الفسفور الناتج بهذه الطريقة هو من النوع الأبيض (و يدعى أحياناً الأصفر) حيث يصب بعد إنتاجه في قوالب على هيئة قضبان اسطوانية وتتم عملية صب القوالب وحفظ الفسفور جميعها تحت الماء بسبب درجة حرارة اتقاده الواطئة وسرعة اتحاده مع الاوكسجين، وسرعة اشتعاله في الهواء، والشكل (7 - 8) يوضح طريقة إنتاج الفسفور صناعياً.



الشكل (7 - 8)
انتاج الفسفور صناعياً.

7 - 4 - 3 خواص الفسفور

الفسفور الاعتيادي مادة صلبة بيضاء اللون (أو مصفرة) شمعية القوام، أما الفسفور النقي فهو مادة صلبة عديمة اللون وشفافة. وهناك أنواع أخرى منه حمراء اللون أو سوداء (أو بنفسجية) والشائعة منها الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر. وتخالف هاتان الصورتان من صور الفسفور فيما بينهما بالخواص كما مثبت في الجدول (7 - 1).

إن الفسفور الأبيض أكثر فعالية من الفسفور الأحمر في الدرجات الحرارية الاعتيادية، وذلك لاختلاف كيفية ترابط الذرات المكونة لكل صورة من هاتين الصورتين من صور هذا العنصر. ومن أهم خواص الفسفور الأبيض هي:

- 1 - يتوجه الفسفور الأبيض في الظلام ليبدو بلون أخضر باهت عند تعرضه لهواء رطب و تدعى هذه العملية بالتألق



الفسفور الأبيض.

الكيميائي ويصاحب هذه العملية انبعاث رائحة تشبه رائحة الثوم.

2 - يشتعل بشكل تلقائي في الهواء عند درجة حرارة الغرفة الاعتيادية نتيجة لتأكسده بكمية كافية من الاوكسجين مكونا خماسي اوكسيد الفسفور (P_2O_5) وحسب المعادلة الآتية:



وتحت ظروف أخرى (بكميات محددة من الاوكسجين) يتآكسد الفسفور الأبيض ليكون ثلاثي اوكسيد الفسفور (P_2O_3) كما في المعادلة الآتية:



3 - يعتبر الفسفور الأبيض مادة سامة بالنسبة لخلايا الكائنات الحية ويؤدي دخول الفسفور إلى داخل الجهاز الهضمي وذوبانه في العصارات الهضمية إلى حالة تسمم على خلاف الفسفور الأحمر الذي لا يذوب في هذه العصارات.



الفسفور الأحمر.

الجدول 7 - 1 مقارنة بين الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر

الفسفور الأحمر	الفسفور الأبيض
1- مظهره الخارجي أحمر اللون مائل إلى البنفسجي.	1 - شبه شفاف أبيض اللون مائل إلى الصفرة.
2 - ينتج بشكل قضبان تحفظ تحت الماء لفعاليتها العالية.	2 - ينتج بشكل مسحوق، لا يتأثر بالهواء في الظروف الاعتيادية.
3 - أعلى كثافة من الفسفور الأبيض.	3 - أقل كثافة من الفسفور الأحمر.
4 - لا يذوب في المذيبات العضوية ولا يذوب في الماء.	4 - يذوب في بعض المذيبات مثل ثنائي كبريتيد الكاربون، ولا يذوب في الماء.
5 - يتسامى بالتسخين.	5 - له درجة انصهار واطئة.
6 - درجة اتقاده عالية.	6 - له درجة اتقاد واطئة لذلك يشتعل بسهولة.
	7 - سام.



اشتعال الفسفور الأبيض في الهواء.

7 - 4 - 4 بعض مركبات الفسفور

1 - حامض الفسفوريك (H_3PO_4)

هو سائل كثيف القوام عديم اللون رائق وليس له رائحة. يعتبر هذا الحامض من الحوامض الضعيفة غير المؤكسدة ويتفاعل مع القواعد مكوناً أملاح الفوسفات والتي لها أهمية كبيرة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

2 - فوسفات الصوديوم (Na_3PO_4)

تستعمل بشكل واسع كإحدى مكونات مساحيق التنظيف، حيث تتحلل فوسفات الصوديوم تحللاً مائياً (تفاعل مع جزيء الماء) لتكون هيدروكسيد الصوديوم التي تساعده في إزالة الدهون العالقة بالأجسام، وتستعمل أيضاً في تحلية الماء (تحويل الماء العسر الذي لا يرغو فيه الصابون إلى ماء يسر). ويستعمل هذا الملح كمادة حافظة لبعض المواد الغذائية واللحوم ولها استعمالات كثيرة أخرى.

7 - 4 - 5 الاستعمالات الصناعية لبعض مركبات الفسفور

1 - صناعة الثقاب

يعامل عود الثقاب بمحلول لفوسفات الأمونيوم ($NH_4)_3PO_4$) حيث تساعده هذه المادة على احتراق العود بهب بدون دخان، واستمرار اتقاد العود حتى النهاية، إضافة لذلك فإنها تمنع اتقاد العود بعد انطفاء الشعلة مما يقلل الخطير الناجم عن رمي العود مباشرةً بعد انطفاء الشعلة. ويفطى رأس العود بعجينة تتكون من:

- أ - مادة قابلة للاشتعال مثل كبريتيد الانتيمون Sb_2S_3 .
- ب - مادة مؤكسدة مثل كلورات البوتاسيوم $KClO_3$.
- ج - مادة تزيد من الاحتكاك مثل مسحوق الزجاج.
- د - مادة صمغية تربط مكونات العجينة.



استعمال الفسفور في
صناعة اعواد الثقاب.

وعند حك رأس العود بجانب العلبة التي تحتوي على الفسفور الأحمر، تتولد حرارة تكفي لبدء الاشتعال على جانب العلبة ثم تنتقل الشعلة إلى رأس العود ويستمر الاشتعال.

2 - الأسمدة الفوسفاتية

لما كان عنصر الفسفور أساسياً لنمو النباتات ويؤدي دوراً هاماً في حياة الكائنات الحية وفي بناء الهيكل العظمي للإنسان والحيوانات، لذلك كان من الضروري أن يكون أحد العناصر التي يستمدّها النبات من التربة بشكل مركبات قابلة للذوبان، وحيث أن فوسفات الكالسيوم (التي هي المصدر للفسفور في الطبيعة) ملح قليل الذوبان جداً في الماء لذلك كان من اللازم تحويله إلى ملح سهل الذوبان في الماء لغرض استعماله كسماد للنباتات. وعند معاملة فوسفات الكالسيوم (الموجودة في الصخور في الطبيعة) مع حامض الكبريتيك، تتحول إلى صيغة كيميائية أخرى، تعرف تجارياً بسماد السوبر فوسفات، وتكون قابلة الذوبان بالماء ليتسنى للنبات الاستفادة منها وكما هو موضح في المعادلة الآتية:



يستخدم هذا السماد في زيادة خصوبة التربة، ويمكن تحضير نوع آخر من الأسمدة الفوسفاتية من تفاعل حامض الفسفوريك مع فوسفات الكالسيوم مكوناً ساماً يدعى تجارياً السوبر فوسفات الثلاثي الذي يكون أكثر جودة من السوبر فوسفات الاعتيادي لأنّه لا يحتوي على كربونات الكالسيوم وكما هو موضح في المعادلة التالية:



تحتاج كل النباتات إلى السماد الفوسفاتي ولا سيما النباتيات منها (مثل الحنطة والشعير والذرة ... الخ) فهو



أهمية الأسمدة الفوسفاتية
في الزراعة.

يقوى ساقانها ويعجل نمو بذورها ويزيد من مقاومتها للأمراض.

ومن الجدير بالذكر أن بلادنا - العراق - يعد مصدراً مهماً لفوسفات الكالسيوم الموجود في الطبيعة، حيث وجدت كميات كبيرة منها في منطقة الرطبة ضمن حقول عكاشات الواقعة في محافظة الانبار، ويعد مشروع استثمارها بشكل تجاري من المشاريع المهمة لاستثمار الفوسفات.



استخدام الأسمدة الفوسفاتية
في الزراعة.

أسئلة الفصل السابع

2.7 اختر الجواب الصحيح الذي يكمل العبارات التالية:

- 1 - يشكل النتروجين حوالي (21%, 78%) من حجم الغلاف الجوي.
- 2 - يمكن تحضير غاز النتروجين مختبريا بتسخين مزيج من (أوكسيد النحاس، كلوريد الكالسيوم، كلوريد الامونيوم) و ملح نتريت الصوديوم بوجود كمية قليلة من الماء.
- 3 - من بين المواد التي يدخل في تركيبها الفسفور مادة واحدة تستعمل مباشرة كسماد فوسفاتي هي (العظام، فوسفات الكالسيوم، السوبر فوسفات).
- 4 - يمكن ل محلول الامونيا ان يحول (لون ورقة زهرة الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق، لون ورقة زهرة الشمس الزرقاء إلى اللون الأحمر، لون ورقة زهرة الشمس الحمراء إلى اللون الصفر).
- 5 - إحدى صورتي الفسفور تكفي حرارة يدك لاتقادها ولذلك يلزم عدم مسکها باليد عند استعمالها لإجراء تجارب تتعلق بخواص الفسفور وهي (الفسفور الأحمر، الفسفور الأبيض).
- 6 - يحضر حامض النتريك بكميات تجارية وذلك (بتسخين مزيج مكون من ملح نترات البوتاسيوم مع حامض الكبريتيك المركز، بأكسدة الامونيا بالهواء بوجود البلاتين كعامل محفز، بتحلل جزيئة الامونيا مائياً).

1.7 أكمل كل فراغ بما يناسبه في كل مما يأتي:


- 1 - العدد الذري للنتروجين لذلك تحتوي ذرة النتروجين بروتوناً يدور حولها إلكتروناً.
- 2 - العدد الذري للفسفور لذلك تحتوي نواة ذرة الفسفور بروتوناً يدور حولها إلكتروناً.
- 3 - يغطى رأس عود الثقب بعجينة تتكون من مواد منها:
 - أ - مادة قابلة للاشتعال مثل
 - ب - مادة مؤكسدة مثل
 - ج - مادة تزيد من قوة الاحتكاك مثل
- 4 - يتواجد غاز النتروجين في الطبيعة على هيئة جزيء الذرة صيغتها الكيميائية .. .
- 5 - NH_3 هو الصيغة الكيميائية لجزيء وهو جزيء مكون من اتحاد ذرة واحدة من عنصر و ثلاثة ذرات من عنصر .. .
- 6 - من فوائد السماد الفوسفاتي على السنبليات انه:
 - أ -
 - ب -
 - ج - .. .

أسئلة الفصل السابع

- 5 - يحفظ الفسفور الأحمر في قناني تحت الماء.
- 6 - عند ترك حامض النتريك النقي لفترة من الزمن يتتحول لونه إلى اللون الأصفر.
- 7 - الفسفور الأبيض أكثر فعالية من الفسفور الأحمر مع إنهم صورتان لعنصر واحد.
- 8 - الفسفور الأبيض مادة سامة جداً لذلك تحفظ تحت الماء.

7- اغلب ما يتكون عند احتراق الفسفور في كمية كافية من الهواء هو (ثلاثي اوكسيد الفسفور، خماسي اوكسيد الفسفور، نتريت الفسفور).

3.7 أكمل كل من المعادلات التالية ثم وازنها واذكر أسماء المواد المتفاعلة والنتاجة:



4.7 ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وضع علامة (X) أمام العبارة الخاطئة ثم صلح الخطأ لكل مما يأتي:

1 - لا يوجد عنصر الفسفور في الطبيعة إلا بصورة مركبات فقط.

2 - تستعمل أعلى درجات حرارية ممكنة في عملية إنتاج الامونيا صناعياً.

3 - تحتوي ذرة النيتروجين على خمسة الكترونات في غلافها الخارجي ولذلك يمكنها أن تكتسب الكترون واحد أو اكتساب ثلاثة الكترونات أو المشاركة في تكوين أواصر تساهمية قد تكون مفردة أو متعددة.

4 - المركبات المسماة "فوسفات" هي أملاح لحامض الفسفوريك H_3PO_4 .

الزمرة السادسة

Group VIA



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان :

- يتعرف على أسماء ورموز عناصر الزمرة السادسة VIA.
- يفهم الصفات العامة وتدرجها لعناصر الزمرة السادسة VIA.
- يعبر عن الترتيب الإلكتروني لعناصر الزمرة السادسة.
- يعرف مناطق وجود الكبريت ويتعرف على صوره في الطبيعة.
- يتعرف على بعض المركبات المهمة والشائعة للكبريت واستعمالاتها.

٨ - ١ مقدمة

تقع عناصر الزمرة السادسة VIA على يمين الجدول الدوري وتضم خمسة عناصر وهي: الاوكسجين (O) والكبريت (S) والسلينيوم (Se) والتيلوريوم (Te) والبولونيوم (Po) ويبين الشكل (٨ - ١) موقع هذه الزمرة في الجدول الدوري.

⁸ O	
¹⁶ S	
³⁴ Se	
⁷⁶ Te	
¹¹⁸ Po	

1 IA	18 VIIIA																	
1 H	2 IIA																	
3 Li	4 Be																	
11 Na	12 Mg	3 LiB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIIB	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IB	13 IIIa	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 He	
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Al	32 Si	33 P	34 S	35 Cl	36 Ar	
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
53 Cs	54 Ba	55 La	56 Hf	57 Ta	58 W	59 Re	60 Os	61 Ir	62 Pt	63 Au	64 Hg	65 Tl	66 Pb	67 Bi	68 Po	69 At	70 Rn	
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub							

الشكل (٨ - ١)

موقع عناصر الزمرة VIA في الجدول الدوري.

٨ - ٢ الصفات العامة للزمرة السادسة VIA

تتدرج خواص هذه العناصر بازدياد اعدادها الذرية حيث يُعد الاوكسجين والكبريت والسلينيوم من اللافزات، أما التلوريوم فله صفات أشبه بالفلزات. أما البولونيوم فله صفات فلزية. إن جميع الزمرة السادسة VIA تمتلك ست




- (أ) بلورة طبيعية للكبريت.
- (ب) السلينيوم.
- (ج) التلوريوم.

الكترونات في الغلاف الخارجي والذي يدفعها إلى اكتساب الكترونين من العناصر الأخرى لكي تمتلك ترتيباً كترونياً مستقراً مشابهاً لترتيب العناصر النبيلة .

8 - 3 الكبريت

Sulfur



رسم الترتيب الالكتروني
لذرة الكبريت.

الرمز الكيميائي : S

العدد الذري : 16

عدد الكتلة : 32

الترتيب الالكتروني

رقم الغلاف	عدد الالكترونات	الغلاف (n)
K	2	1
L	8	2
M	6	3



الكبريت في المناطق
البركانية.

8 - 3 - 1 وجوده

يوجد الكبريت في الطبيعة بصورة عنصر حرفي مناجم خاصة كما هو الحال في مناجم كبريت المشراق في الموصل شمال العراق. كما يوجد الكبريت بكميات كبيرة على شكل مركبات في المناطق البركانية مثل غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S و ثنائي أوكسيد الكبريت SO_2 اللذان يتتصاعدان ضمن الغازات البركانية الأخرى. ويتوارد الكبريت أيضاً على هيئة كبريتيدات فلزية مثل بايريت الحديد (II) والنحاس (II) ويعرف بالجالكوبايريت $CuFeS_2$ ، وكذلك على هيئة أملاح الكبريتات مع الفلزات ومن أهمها كبريتات الصوديوم $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ وكبريتات الكالسيوم $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ وغيرها.



بايريت الحديد (II)
والنحاس (II) ويعرف
بـالجالكوبايريت ($CuFeS_2$).

8 - 3 - 2 تحضير الكبريت

أ- تحضير الكبريت مختبرياً

يمكن تحضير الكبريت مختبرياً من إضافة حامض الهيدروكلوريك المركز إلى محلول ثايوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ بدرجة (-10°C). يتربس الكبريت ويجمع بالترشيح حسب معادلة التفاعل الآتية:



حامض الهيدروكلوريك
المرکز


ثابو كبريتات
الصوديوم

كبريت
ثنائي اوكسيد
الكبريت

ماء
كلوريد
الصوديوم

ب - استخراج الكبريت

يستخرج الكبريت الموجود حراً على شكل تربات تحت سطح الأرض بطريقة فراش (Frasch prosess) وتمثل هذه الطريقة بصره الكبريت وهو في باطن الأرض باستخدام معدات خاصة [الشكل (8 - 2)] مكونة من ثلاثة أنابيب داخل بعضها البعض متمحورة مركزياً. يدفع بخار الماء المضغوط والمسخن إلى درجة (170 °C) في الأنبوة الخارجية (أ) إلى مكان تجمع الكبريت مما يؤدي إلى انصهار الكبريت وهو داخل الأرض والذي سيرفعه الهواء المضغوط الذي يضخ من الأنبوة الداخلية (ب) إلى أعلى فيخرج الكبريت المنصهر من الأنبوة (ج) الوسطى مختلطًا ببعض فقاعات الهواء إلى سطح الأرض. وعند السطح يصب الكبريت المنصهر في أحواض كبيرة ويترك لكي يبرد ويتصلب. أن أغلب الكبريت المنتج بهذه الطريقة له درجة نقافة تتراوح ما بين (99.5 - 99.9 %) ولا يحتاج إلى إعادة تنقية.



الشكل (8 - 2)
استخراج الكبريت بطريقة
فراش.

٨ - ٣ - ٣ الخواص العامة للكبريت

١- الخواص الفيزيائية

يمتلك الكبريت الخواص الفيزيائية الآتية:

أ. مادة صلبة في درجات الحرارة الاعتيادية ذات لون أصفر.

ب. عديم الطعم ذو رائحة مميزة.

ج. لا يذوب في الماء ولكن يذوب في بعض المذيبات اللاعضوية مثل ثنائي كبريتيد الكاربون CS_2 وإذا تم تبخير CS_2 تدريجياً يتربس الكبريت على شكل بلورات ذات تركيب ثمانى (S₈) [الشكل (8 - 3)].

د. غير موصل للتيار الكهربائي.

هـ. له صور متعددة في الطبيعة تتباين في صفاتها الفيزيائية. يمتلك الكبريت وبعض العناصر الأخرى العديد من الصور وهي إشكال مختلفة للخواص الفيزيائية كالشكل واللون تعود للعنصر نفسه. ويمتلك الكبريت صور عديدة يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين هما:

١ - صور الكبريت البلورية وأكثرها شيوعاً هو الكبريت المعيني وهو مادة بلورية صفراً ليمونية اللون وثابتة عند درجة حرارة الغرفة وهو أكثر الصور استقراراً ويوجد على شكل بلورات كبيرة صفراً في المناطق البركانية. وهناك نوع آخر من صور الكبريت البلوري تدعى بالكبريت المنشوري وذلك لأن بلوراته تشبه المنشور.

٢- الكبريت غير البلوري ومن أمثلتها الكبريت المطاطي أو الكبريت اللدن (Plastic). ويمكن تحضيره من تسخين الكبريت إلى (1500°C) وصب سائل الكبريت في الماء البارد حيث يتكون الكبريت المطاطي [الشكل (8 - 4)] الذي يحتوي على سلاسل حلزونية وهو أقل استقراراً من الكبريت البلوري ويتحول ببطء إلى الصورة البلورية.

الشكل (8 - 4)

- (أ) الكبريت المعيني.
- (ب) الكبريت المنشوري.
- (ج) الكبريت المطاطي.

يمتلك الكبريت الصيغة (S_8), وفي بلورة محورة أخرى نجده بصيغة (S_6) والصورة الأولى من أنشط صور الكبريت بسبب التوتر الشديد على حلقة الكبريت الثمانية كما في الشكل . (5 - 8)



الشكل (5 - 8)
الشكل الفراغي لجزيء الكبريت₈.

2 - الخواص الكيميائية للكبريت

يكون الكبريت غير فعال في درجات الحرارة الاعتيادية ولكن عند تسخينه يصبح نشطاً ويدخل في كثير من التفاعلات الكيميائية فيتحدد بكل العناصر تقريباً اتحاداً مباشراً عند درجة الحرارة المناسبة وكما يأتي:

أ. التفاعل مع اللافلز: يحترق الكبريت بسهولة في الهواء بلهب أزرق متحدلاً مع الأوكسجين الجوي مع توليد كمية كبيرة من الحرارة كما في التفاعل الآتي:



يتفاعل الكبريت مع الكاربون ليعطي سائل ثنائي

كربونات الكاربون : CS_2




ب. التفاعل مع الفلزات: يتفاعل الكبريت مع الفلزات كالحديد والنحاس والزنك ليعطي كربوناتاتها:



كربونات الحديد (II)

تمرين (1 - 8)
اكتتب معادلات موزونة
لتفاعلات الكبريت مع كل
من النحاس والخارصين.

ج. التفاعل مع الحوامض المركزة والمؤكسدة: لا يتآثر الكبريت بالحوامض المخففة في حين يتآكسد بالأحماض المركزة القوية مثل حامض الكبريتيك الساخن محرراً أكسيد لافلزية:



مركز ساخن

ومع حامض النتريك المركز الساخن محرراً أوكسيد اللافلز NO_2 :



٤ - ٣ - استعمالات الكبريت

للكبريت استخدامات عديدة في المجالات الصناعية والزراعية فهو يدخل في صناعة الثقب والبارود الأسود والألعاب النارية لسهولة اشتعاله. كما يستخدم في الزراعة لمعادلة قلوية التربة و بعض أنواع الأسمدة وفي مبيدات الفطريات والحشرات. أما أهم استخدامات الكبريت هو استخدامه بكميات كبيرة في تحضير حامض الكبريتيك، والذي يُعد أهم مادة كيميائية تجارية في العالم. ويستخدم في إنتاج الأصباغ والدهانات (الطلاء)، والورق والمنسوجات وعدد من المنتجات الكيميائية الصناعية. كما يُستخدم أيضاً في تعدين الفلزات وفي تصفية النفط. أما المنتجات الأخرى المحتوية على الكبريت، فتشمل المطاط، والشامبو وبطاريات السيارات (المراكم) وفي أملاح المواد الكيميائية المستخدمة في أفلام التصوير. كما يدخل الكبريت ومركباته في صناعة الأدوية كواحد من المكونات، حيث يستخدم لعلاج بعض الأمراض الجلدية كما يستخدم زهر الكبريت في علاج اضطرابات الهضم.

٤ - ٣ - ٥ بعض مركبات الكبريت


أ - غاز ثنائي أوكسيد الكبريت



يتولد غاز ثنائي أوكسيد الكبريت SO_2 بشكل رئيسي من احتراق الكبريت بوجود الأوكسجين. يتصاعد هذا الغاز بكميات كبيرة في الطبيعة من جراء النشاطات البركانية، ويتحول كذلك من بعض العمليات الصناعية أثناء تعدين بعض العناصر واستخلاصها وكذلك نتيجة لحرق المشتقات النفطية أو الفحم الحجري.

يحضر غاز ثنائي أوكسيد الكبريت مختبرياً من إضافة حامض الكبريتيك المخفف إلى كبريتات الصوديوم Na_2SO_3 ، [الشكل (8 - 6)] ولكونه أثقل من الهواء يمكن أن يجمع عن طريق ازاحة الهواء إلى الأعلى، كما في المعادلة الآتية:


تولد غاز ثنائي أوكسيد الكبريت من احتراق الكبريت بوجود الأوكسجين.



الشكل (8 - 6)

جهاز مختبرى لتحضير غاز ثنائى اوكسيد الكبريت من تفاعل الحوامض المخففة مع كبريتات الصوديوم.

ان غاز ثنائى اوكسيد الكبريت غاز عديم اللون ذا رائحة نفاذة قوية، أثقل من الهواء ويدبُّغ قليلاً في الماء مولداً محلولاً لحامض الكبريتوز الضعيف:




ثائقى اوكسيد الكبريت ماء حامض الكبريتوز

لذلك السبب عندما نضع ورقة زهرة الشمس الزرقاء المبللة بالماء في قناني جمع الغاز المستعملة في طريقة التحضير المختبرى لغاز ثنائى اوكسيد الكبريت نلاحظ تحول لونها إلى اللون الأحمر نتيجة تأثير حامض الكبريتوز المتولد كما في المعادلة اعلاه.

يحضر غاز ثنائى اوكسيد الكبريت صناعياً بكميات كبيرة من حرق الكبريت في الهواء عن طريق ضخ الكبريت المصهور في أبراج حرق خاصة. أن الغاز الناتج بهذه الطريقة يحتوى على نسبة من الشوائب مما يستوجب تنقية:



يستعمل غاز ثنائى اوكسيد الكبريت صناعياً في قصر ألوان المواد العضوية كالورق والقصص والحرير الصناعي والأصوف والتى تتأثر عند قصرها بغاز الكلور



الشكل (8 - 7)

يستعمل غاز ثنائى اوكسيد الكبريت SO_2 صناعياً في قصر ألوان المواد العضوية كالورق والقصص والحرير الصناعي والأصوف والتى تتأثر عند قصرها بغاز الكلور. فالوردة التي إلى اليسار موضوعة في جو من غاز ثنائى اوكسيد الكبريت.



[الشكل (8 - 7)]. أن أغلب المواد المقصورة بهذا الغاز تسترجع ألوانها عند تعرضها إلى الهواء. ويمكن استخدام هذا الغاز لأغراض التعقيم عن طريق حرق كميات من الكبريت داخل الأماكن المراد تعقيمها، ويستعمل كذلك في صناعة حفظ الأغذية.

الشكل (8 - 8) يحترق الكبريت بسهولة بوجود مصدر للأشعال في الهواء بلهب ازرق متحداً مع الاوكسجين الجوي. ويشتعل تلقائياً بدرجة 400°C وينتج في الحالتين غاز ثبائي اوكسيد الكبريت ذو الرائحة النفاذة.

ويمكن أن يشتعل الكبريت تلقائياً بدرجة 400°C بوجود الأوكسجين وينتج عنه غاز ثبائي اوكسيد الكبريت ذو الرائحة النفاذة [الشكل (8 - 8)] وهو غاز ضار جداً وكثرة انطلاقه في الهواء نتيجة حرق الفحم الحجري أو الأنشطة الصناعية الأخرى يكون له آثار صحية سيئة جداً على الإنسان والحيوان والنبات كما أنه من أكثر مسببات الأمطار الحامضية.

ب - غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S

غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S هو غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة نفاذة كرائحة البيض الفاسد و يتكون في الطبيعة بثلاث طرائق هي: تحلل المواد العضوية او من المياه الجوفية المحتوية على المواد الكبريتية كما في العيون الكبريتية في حمام العليل في محافظة نينوى او من النشاط الحيوي للبكتيريا التي تستخدم الحديد والمنغنيز كجزء من غذائها.

يوجد غاز كبريتيد الهيدروجين في الغازات النفطية والطبيعية، ويحتوي الغاز الطبيعي على 28% منه لذا فقد يتسبب في تلوث الهواء في المناطق التي يوجد بها إنتاج للغاز الطبيعي وكذلك في مناطق مصافي النفط من الممكن أن ينبعث الغاز من خلال الصناعات التي تتركز على مركبات الكبريت.

يحضر غاز كبريتيد الهيدروجين في المختبر بالجهاز نفسه الذي استخدم في تحضير SO_2 [الشكل (8 - 6)] من تفاعل الحوامض المخففة مثل حامض الكبرتيك مع كبريتيدات الفلزات مثل كبريتيد الحديد(II) وفق المعادلة الآتية:



كبريتات الحديدوز كبريتيد الهيدروجين حامض الكبريتيك كبريتيد الحديد(II)
عند إمداد غاز كبريتيد الهيدروجين في محلول الأيونات
الفلزية مثل محلول كبريتات النحاس، تلاحظ تكوين راسب
أسود هو كبريتيد النحاس وفق المعادلة الآتية:




كبريتيد النحاس حامض الكبريتيك كبريتيد الهيدروجين

جـ - حامض الكبريتيك H_2SO_4

يعد حامض الكبريتيك H_2SO_4 ، من أوائل الحوامض التي تم التعرف عليها، حيث عرفه العرب منذ القرن الثامن الميلادي، وعرفته أوروبا في القرنين الرابع والخامس عشر، أطلق عليه جابر بن حيان اسم زيت الزاج بسبب تحضيره من تسخين وتقطر الزاج الأخضر (كبريتات الحديد(II) المائية) وأملأح الكبريتات الأخرى. أن حامض الكبريتيك هو سائل عديم اللون ذي القوام ذي كثافة عالية لا رائحة له عندما يكون نقياً وهو حامض معدني قوي يذوب في الماء بجميع التراكيز ومحاليله موصلة للتيار الكهربائي.

١ - تحضير حامض الكبريتيك صناعياً:

يحضر حامض الكبريتيك بطريقة التلامس والتي يمكن تلخيصها بتفاعل الكبريت مع الاوكسجين لتكوين ثانوي اوكسيد الكبريت:



وعند إدخال غاز ثاني اوكسيد الكبريت إلى برج التلامس الذي يحتوي على عامل مساعد خامس اوكسيد الفنadiوم (V_2O_5) للحصول على ثلاثي اوكسيد الكبريت وفقاً للتفاعل الآتي :




ثلاثي اوكسيد الكبريت هواء ثانوي اوكسيد الكبريت

ثم يضاف حامض الكبريتيك المركب فيتكون $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ للداخل ثم يتم بعدها إضافة الماء فيكون حامض الكبريتيك المركب وفقاً للمعادلات الآتية :



حامض الكبريتيك الداخلي







**مخطط لغراحل تحضير
حامض الكبريتิก صناعياً
بطريقة التلامس.**

حامض الكبريتيك سائل زيتوي القوام عديم اللون والرائحة وله كثافة عالية تبلغ 1.84 غ/سم^3 . يذوب في الماء بجميع التراكيز مولد حرارة عالية مما يستوجب الحذر عند تلقيه.



حاوية معدنية لنقل
كميات تجارية من حامض
الكبريتิก المركز



الشكل (9 - 8)

يمتلك حامض الكبريتيك ميلاً شديداً لانزاع الماء من المركبات العضوية ونلاحظ ذلك عند اضافة حامض الكبريتيك الى بيكر يحتوي مقدار من سكر القصب.




2 - استعمالات حامض الكبريتيك

يُنتج حامض الكبريتيك سنويًا بكميات كبيرة تفوق أي مادة كيميائية أخرى. ويستعمل الحامض لغراض متعددة أهمها:

- 1 - في تحضير الحوامض الأخرى، كحامض النتريك والهيدروكلوريك بسبب درجة غليانه العالية.
 - 2 - في تجفيف المواد، لاسيما الغازات التي لا تتفاعل معه بسبب ميله الشديد للاتحاد بالماء.
 - 3 - في تنقية البترول، وازالة الشوائب عنه.
 - 4 - في صناعة المتفجرات كنترات الكليسيرين ونترات السيليوز.
 - 5 - في اذابة الصدأ الذي يكسو الادوات الحديدية قبل طلائها بالخارصين.
 - 6 - في صناعة البطاريات، (بطاريات الخزن الرصاصية)، وفي الطلاء الكهربائي بسبب نقل محاليله للتيار الكهربائي.
 - 7 - في صناعة الاسمدة الكيميائية مثل كبريتات الامونيوم والاسمدة الفوسفاتية.

الكتيريات - 4

هي أملاح حامض الكبريتيك الناتجة من تفاعله مع الفلزات أو أكسيداتها أو هيدروكسيداتها أو كarbonاتها حيث تكون أملاح الكبريتات الفلزية كما في حالة فلز الـxارصين وأوكسيد الـxارصين وهيدروكسيد الـxارصين وكarbonات الـxارصين وكما مبين في المعادلات الآتية:






وتتوفر العديد من أملاح الكبريتات المائية في الطبيعة في مناجم ملحية مثل كبريتات الصوديوم المائية $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ أو ترببات مثل كبريتات الكالسيوم المائية $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ والمعروف محلياً باسم البورك والذي يجف بدرجة حرارة مناسبة إلى $(\text{CaSO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ويستعمل في البناء وفي النقوش المعمارية وفي صناعة التمايل وفى تجسير العظام. وتستعمل كبريتات المغنيسيوم المائية $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ في صناعة الأنسجة القطنية في حين تستعمل كبريتات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ كسماد نتروجيني.

٨ - ٤ - ١ الكشف عن أيونات الكبريتات

ويتمكن الكشف عن أيونات الكبريتات في محلاليها المائية بإضافة محلول يحتوي على أيونات الباريوم مثل كلوريد الباريوم إليها حيث سيعتبر راسب من كبريتات الباريوم البيضاء:



أسئلة الفصل الثامن

5.8 يسخن الماء بدرجة (170 °C) إلى أعماق مختلفة من باطن الأرض حيث ينبع الماء بدرجة (170 °C):

أ. بين كيف يمكن الحصول على الماء الساخن بدرجة (170 °C) مع العلم أن درجة غليان الماء هي (100 °C)؟

ب. ما الذي يمرر في الأنبوة الخارجية (أ)؟
ج. ما دور الأنبوة (ب) في هذه العملية؟

6.8 كيف تفصل خليطاً ناعماً جداً من ملح الطعام والطباشير والكبريت، صنف طريقة عملية لفصل هذه المواد للحصول عليها بشكل نقى وجاف.

7.8 اكتب معادلات كيميائية موزونة لتفاعل الكبريت المباشر مع الفلزات واللالفلزات.

8.8 أشرح باختصار طريقة التلامس لتصنيع حامض الكبرتيك تجارياً مع المعادلات اللازمة.

9.8 أكمل ووازن التفاعلات التالية مع ذكر أسماء المواد المتفاعلة والناتجة:



1.8 تدرج الخواص الفيزيائية لعناصر الزمرة السادسة VIA من الأوكسجين إلى البولونيوم، أذكر هذه الصفات.

2.8 ما الصفة الالكترونية المشتركة لعناصر الزمرة السادسة VIA؟

3.8 أختار الجواب المناسب الذي يكمل العبارات الآتية:

أ. يوجد عنصر الكبريت في الطبيعة بصورة:

1- حرفة فقط.

2- مرکبات فقط.

3- حرفة ومرکبات.

ب. توجد بعض العناصر مثل الكبريت، الفوسفور، والكاربون في الحالة الصلبة بأشكال مختلفة تتمايز فيما بينها في بعض الخواص الفيزيائية تدعى:

1- صور العنصر

2- أشكال العنصر

3- أنواع العنصر

ج. من بين الجزيئات الصلبة الآتية في الحالة الحرجة جزيء واحد يحتوي على ثمان ذرات هو جزيء:

1- الكاربون 2- اليود

3- الكبريت 4- الفوسفور الأبيض

4.8 بين ماذا يحدث عند تمرير غاز كبريتيد الهيدروجين في محليل كبريتات الخارصين، خلات الرصاص، و كبريتات النحاس؟ وضح ذلك مستعيناً بالمعادلات.

الزمرة السابعة

Group VIIA



بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرًا على ان :

- يحدد موقع الزمرة السابعة VIIA في الجدول الدوري.
- يعرف رموز واسماء عناصر هذه الزمرة.
- يدرك الصفات العامة لـلزمرة السابعة.
- يدرك اهمية الكلور وبعض مركباته.
- يستدل او يكشف عن الكلوريدات وغاز كلوريد الهيدروجين.

٩ - ١ عناصر الزمرة السابعة



عناصر هذه الزمرة هي الفلور (F) والكلور (Cl) والبروم (Br) واليود (I) والاستاتين (At) وتسمى عناصر الزمرة بالهالوجينات وتحتسب بصفات لافلزية عالية، وهي شديدة الفعالية لذا لا توجد حرة في الطبيعة بل متحدة مع غيرها من العناصر. تتشابه عناصر هذه الزمرة في كثير من خواصها الفيزيائية أو الكيميائية مع وجود تدرج واضح في هذه الخواص إضافة إلى ذلك يوجد بينها بعض الاختلاف في خواص أخرى.

ويبيّن الشكل (٩ - ١) موقع هذه الزمرة في الجدول الدوري.

الهالوجينات.

1 IA	18 VIIA																	
1 H	2 He																	
3 Li	4 Be																	
11 Na	12 Mg	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIIB	8	9 VIIIB	10	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	2 He	
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub							

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

٩ - ٢ الصفات العامة للزمرة السابعة (الهالوجينات)

(١ - ٩)
موقع الزمرة VIIA في
الجدول الدوري.

أ - تحتوي جميع عناصر هذه الزمرة على سبعة الكترونات في غلافها الخارجي وتميل في تفاعلاتها إلى اكتساب الكترون واحد لأشباع غلافها الخارجي. وتدرج قابليتها على اكتساب الالكترون من الفلور إلى اليود.

ب - توجد الهالوجينات في درجة الحرارة الاعتيادية في




الشكل (9 - 2)
الكلور غاز والبروم سائل
واليود صلب..

حالات فيزيائية مختلفة فالفلور (F_2) والكلور (Cl_2) غازات اما البروم (Br_2) فهو سائل واليود (I_2) صلب. [الشكل (9 - 2)].

ج - الهالوجينات مواد ملونة لأنها تمتص جزء من الأشعة المرئية التي تسقط عليها.

د - تزداد درجة انصهار وغليان الهالوجينات مع ازدياد العدد الذري.

9 - 3 غاز الكلور Chlorine



رسم الترتيب الالكتروني
لذرة الكلور.

رمز العنصر:
العدد الذري:
عدد الكتلة:

تم التعرف على غاز الكلور لأول مرة في عام (1774م) من قبل العالم شل (Scheel) من تفاعل ثنائي اوكسيد المنغنيز (MnO_2) مع حامض الهيدروكلوريك المركز.


الترتيب الالكتروني:

رقم الغلاف	رقم الغلاف(n)	عدد الالكترونات
K	1	2
L	2	8
M	3	7

يتبيّن من الترتيب الالكتروني لذرة الكلور انها تميل لاكتساب الكترون واحد لملئ غلافها الخارجي (الغلاف الثالث) لذلك يكون الكلور في معظم مركباته احادي التكافؤ والعدد التأكسدي له (-1) لانه يميل لاكتساب الكترون واحد لتكون ايون الكلوريد السالب (Cl^-).

٣ - ١ وجود الكلور

لا يوجد الكلور حراً في الطبيعة لفعاليته الكيميائية العالية ولاتحاده بسهولة مع غيره من العناصر وتكونه مركبات الكلور الواسعة الانتشار في الطبيعة واهماها كلوريد الصوديوم NaCl (ملح الطعام) الذي يعد اكثرا الاملاح انتشاراً في الطبيعة فهو يوجد في ماء البحر كما يوجد في التربes الملحية تحت سطح الارض والشكل (9 - 3) يوضح الشبكة البلورية لجزيئه كلوريد الصوديوم (NaCl).




الشكل (9 - 3)
الشبكة البلورية لكلوريد
الصوديوم.

٣ - ٢ تحضير غاز الكلور

١- تحضير الغاز مختبرياً

يحضر غاز الكلور في المختبر كما في الشكل (9 - 4) من اكسدة حامض الهيدروكلوريك المركز بواسطة ثانوي اوكسيد المنغنز وحسب المعادلة الآتية:

حرارة




الشكل (4 - 9)
جهاز تحضير الكلور
مختبرياً.


ويخلص الغاز الناتج من غاز HCl والماء (الرطوبة) بامراره على قناني حاوية على الماء وحامض الكبريتيك على التوالي. حيث يلاحظ ان ثنائي اوكسيد المنغنيز في هذه التجربة لا يسلك سلوك عامل مساعد وانما يُستهلك بعد انتهاء التفاعل فهو يسلك كعامل مؤكسد

ب - تحضير الغاز صناعياً

يحضر غاز الكلور صناعياً بالتحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم في الماء او لمنصهر كلوريد الصوديوم في خلية التحليل الكهربائي كما في الشكل (9 - 5).



الشكل (9 - 5)
جهاز التحليل الكهربائي
لمنصهر NaCl




٩ - ٣ - ٣ خواص غاز الكلور

- لونه اخضر مصفر.
- يتم جمع الغاز بازاحة الهواء إلى الأعلى مما يدل على أن غاز الكلور أثقل من الهواء.
- غاز قليل الذوبان في الماء بدرجة الحرارة الاعتيادية.
- يمتاز غاز الكلور برائحته الخانقة فهو يهاجم الانسجة المخاطية للأنف والبلعوم وعند استنشاقه بكمية كبيرة يتلف الرئتين ويؤدي إلى الموت.
- يتفاعل غاز الكلور بشدة مع الفلزات الفعالة مثل

الصوديوم المسخن مكوناً كلوريد الصوديوم NaCl الذي هو

مركب أيوني:



6- يتفاعل غاز الكلور بشدة مع الالفلزات مثل الفسفور مكوناً

كلوريدات الفسفور التي هي مركبات تساهمية.



ثلاثي كلوريد الفسفور



خماسي كلوريد الفسفور

7- يتحد غاز الكلور مع غاز الهيدروجين مكوناً غاز كلوريد

الهيدروجين كما في المعادلة الآتية:



غاز كلوريد الهيدروجين غاز الكلور غاز الهيدروجين

٤ - ٣ - ٩ استعمالات غاز الكلور

يستفاد من غاز الكلور في مجالات كثيرة منها:

١- تستعمل في تعقيم مياه الشرب واحواض السباحة.

٢- تستخدم بعض مركبات الكلور في تحضير بعض العقاقير الطبية.

٣- يدخل الكلور في تركيب كثير من المذيبات العضوية الصناعية مثل الكلوروформ CHCl_3 وثنائي كلوريد الميثيل CH_2Cl_2 ورباعي كلوريد الكاربون CCl_4 .

٤- يستعمل الكلور في قصر الوان الانسجة النباتية حيث يعمل كقاصر ومعقم. يتفاعل الكلور مع الماء عند ذوبانه فيه ببطيء في درجات الحرارة الاعتيادية وبسرعة في ضوء الشمس. فهو يتحد مع الماء محرراً الاوكسجين في حالته الذرية ويسمى بالاوكسجين الذري الذي يمتاز بأنه فعال جداً حيث يقوم بازالة الالوان النباتية (قصرها) وقتل الجراثيم للتعقيم. وحسب المعادلة الآتية:




ماء كلور

اووكسجين في محلول كلوريد
حالته الذرية الهيدروجين

5 - يستعمل الكلور في قصر الوان الملابس القطنية بصورة خاصة ولا يستعمل في قصر الصوف والحرير الطبيعي لانه يتلفها. ضع زهرة ملونة او ورقة نباتية في قنينة فيها غاز الكلور الجاف فلا نلاحظ تاثيراً ظاهراً. والآن بلل الزهرة او الورقة النباتية وادخلها في قنينة الغاز واتركها مدة تشاهد زوال اللون مما يدل على ان غاز الكلور يقصر الالوان النباتية وان للماء اهمية كثيرة في عملية القصر حيث يتكون الاوكسجين الذري الذي يقوم بعملية قصر الالوان كما اشرنا اعلاه.

6 - عند امرار غاز الكلور في هيدروكسيد الكالسيوم الجاف $\text{Ca}(\text{OH})_2$ يتكون مسحوق أبيض من هايبيوكلوريت الكالسيوم $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ وهو المادة الفعالة للمسحوق القاصر والذي يستعمل في قصر الالوان والتعقيم وذلك عند تفاعلاته مع الماء بوجود غاز ثبائي اوكسيد الكاربون، يكون حامض الهايبيوكلوريوز HClO الذي يتفكك مولداً الاوكسجين الذري الذي يقوم بعملية القصر كما في المعادلات الآتية:



اوکسجين ذري


9 - 4 غاز كلوريد الهيدروجين HCl

لا يوجد غاز كلوريد الهيدروجين حرّاً في الطبيعة ولكنّه يوجد في العصارات المعدية بشكل محلول لحامض الهيدروكلوريك الذي يساعد على هضم البروتينات.


9 - 4 - 1 تحضير غاز HCl في المختبر

يحضر الغاز في المختبر من تفاعل حامض الكبريتيك المركز مع كلوريد الصوديوم كما في الشكل (9 - 6) وحسب

معادلة التفاعل الآتية:



غاز كلوريد الهايدروجيني HCl كبريتات الصوديوم $\text{Na}_2\text{S}\text{O}_4$ حامض الكبريتيك $\text{H}_2\text{S}\text{O}_4$ مركز الـ



نضع كمية مئوية (10g) تقريباً من كلوريد الصوديوم النقي في دورق زجاجي ذو سداد يخترقه أنبوبان الأول يمتد إلى قعر الدورق والثاني أنبوب توصيل يمتد إلى قنينة زجاجية تحتوي على حامض الكبريتيك المركز بحيث تنفرم نهاية الأنبوب في الحامض، ومن هذه القنينة يخرج أنبوب توصيل آخر يمتد إلى قنينة جمع الغاز الجاف. يسكب في الأنبوب المقام حامض الكبريتيك المركز بحيث يغطي الملح. يسخن الدورق بهدوء نلاحظ حدوث تفاعل مصحوب بانبعاث غاز كلوريد الهيدروجين. نجمع عدة قناني من الغاز ونغلق فوهاتها بأغطية زجاجية ونحتفظ بها لدراسة خواص الغاز.

٩ - ٤ - ٢ خواص كلوريد الهيدروجين

نأخذ احدى القناني المملوءة بالغاز والتي تم جمعها عند تحضيره. ومن اهم خواصه:

الشكل (9-6) جهاز مختبري لتحضير غاز كلوريد الهيدروجين.



الحامض تغير لون ورقة زهرة الشمس الزرقاء الى حمراء.

1 - غاز عديم اللون ويمتاز برائحة خانقة نفاذة.


2 - اثقل من الهواء يجمع بازاحة الهواء الى الاعلى.

3 - محلول المائي لغاز كلوريد الهيدروجين حامضي التأثير على الدلائل ويسمى حامض الهيدروكلوريك، حيث يغير لون ورقة زهرة الشمس الزرقاء الى اللون الاحمر.

4 - كثير الذوبان في الماء وللتتأكد من هذه الخاصية تجرى التجربة الآتية:

نغلق فوهة احد قناني الغاز بسداد مطاطي ذي ثقبين الثقب الاول تخترقه قطارة يحتوي على ماء ويخترق الثقب الثاني انبوب زجاجي مستدق النهاية يمتد الى قعر قنينة الغاز تقريباً. ندخل نهاية الانبوب الخارجية في حوض ماء يحتوي على القليل من دليل المثيل البرتقالى ثم نضغط على بصلة القطارة ونلاحظ تدفق الماء بقوة داخل القنينة عن طريق الانبوب الزجاجي الممتد الى قعر الكأس بشكل نافورة ملونة بلون احمر نتيجة لذوبان الغاز في قطرات الماء المحتجزة في القطارة وبذلك يتخلل الضغط في قنينة الغاز مما يدل على انه كثير الذوبان في الماء. كما في الشكل (9 - 7) الذي يبين نافورة غاز كلوريد الهيدروجين.


(ولا تتم هذه التجربة في الجو الرطب).



الشكل (9 - 7)

جهاز مختبرى لتحضير نافورة كلوريد الهيدروجين.

5 - يتفاعل غاز كلوريد الهيدروجين مع برادة الحديد مكوناً كلوريد الحديد (II) ومحرراً غاز الهيدروجين حسب التفاعل الآتي:




6 - غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال.

٩ - ٤ - ٣ الكشف عن غاز كلوريد الهيدروجين

يغمر ساق ذجاجي في محلول الامونيا ثم نخرجه ونقربه من فوهة قنينة فيها غاز كلوريد الهيدروجين نلاحظ تكون مادة ضبابية بيضاء من كلوريد الامونيوم ناتجة من اتحاد غاز كلوريد الهيدروجين مع غاز الامونيا المنبعث من محلول الامونيا كما في الشكل (9 - 8).



الشكل (9 - 8)
الكشف عن غاز كلوريد
الهيدروجين.




ويعد هذا التفاعل طريقة للكشف عن وجود غاز كلوريد الهيدروجين وأيضاً يمكن استخدامه للكشف عن غاز الامونيا في الوقت نفسه.

ومن الجدير بالذكر ان اذابة غاز كلوريد الهيدروجين في الماء ينتج محلولاً يسمى حامض الهيدروكلوريك الذي يمكن الكشف عنه بإضافة نترات الفضة AgNO_3 حيث يتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة وكما سيأتي في كشف الكلوريدات.

الكلوريدات - 5

وهي املاح لحامض الهيدروكلوريك وتنشأ من احلاط فلز او جذر كالامونيوم مثلًا محل هيدروجين الحامض كما في المعادلات الآتية:




يمكن الحصول على الكلوريدات أيضاً من الاتحاد المباشر بين غاز الكلور والفلزات كما في كلوريد الصوديوم NaCl وكلوريد البوتاسيوم KCl .


ان جميع الكلوريدات قابلة للذوبان في الماء عدا كلوريد الفضة AgCl وكلوريد الزئبق (II) HgCl_2 أما كلوريد الرصاص PbCl_2 فيذوب في الماء الحار ولا يذوب في الماء البارد.

الكشف (الاستدلال) عن الكلوريدات

يُستفاد من عدم ذوبان كلوريد الفضة في الماء كوسيلة للكشف (الاستدلال) عن الكلوريدات وذلك بالإضافة محلول نترات الفضة إلى محاليلها الرائقة مثل محلول NaCl ومحلول حامض الهيدروكلوريك حيث يتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة القابل للذوبان بسهولة في محلول الامونيا كما في المعادلات التالية على التوالي:



أسئلة الفصل التاسع



6.9 علل ما يأتي:

1 - يكون الكلور في مركباته على العموم احادي التكافؤ كما في (NaCl).

2 - غاز الكلور لا يقصر الالوان النباتية إلا بوجود الماء

3 - تكون مادة ضبابية عند تقرير محلول الامونيا (هيدروكسيد الامونيوم) من قنية حامض الهيدروكلوريك المركز.

7.9 كيف تستدل او تكشف عن وجود ما يأتي:

1 - حامض الهيدروكلوريك.

2 - غاز كلوريد الهيدروجين.

8.9 ماذا نقصد بالكلوريدات ؟ بين بمعادلات كيميائية كيفية الحصول على (كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الامونيوم)

9.9 وضح اهم استعمالات غاز الكلور.

10.9 بين مع الرسم جهاز تحضير غاز الكلور مختبريا مع ذكر اهم خواص هذا الغاز.

11.9 اكمل الفراغات الآتية بما يناسبها:

1- يحضر غاز كلوريد الهيدروجين مختبريا من تفاعل مع

..... كما في المعادلة

2 - ومن اهم خواص هذا الغاز الفيزيائية و و و

1.9 كم عدد الالكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي لذرات عناصر الزمرة السابعة VIIA (الهالوجينات).

2.9 هل تميل عناصر الزمرة السابعة الى اكتساب او فقدان الالكترونات لاشباع غلافها الخارجي ولماذا ؟

3.9 ما اهم تفاعلات غاز الكلور ؟

4.9 اختر الاجابة الصحيحة لما يناسب كل عباره مما يأتي:


1 - ان اهم مركب مرتبط بحياة الانسان وواسع الانتشار في الطبيعة هو (كلوريد الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، كلوريد المغنيسيوم، كلوريد البوتاسيوم)

2 - لغاز الكلور لون يميزه عن كثير من الغازات هو اللون (الاحمر ، الاخضر ، الاصفر ، الاخضر المصفر)

3 - تميل ذرة الكلور عند اتحادها بذرة الصوديوم لاكتساب عدد من الالكترونات يساوي (4 ، 3 ، 2 ، 1)

4 - غاز واحد من الغازات الآتية له القابلية على قصر الالوان النباتية هو (الهيدروجين ، الامونيا ، النتروجين ، الكلور)

5.9 اكمل ووازن معادلات التفاعلات الآتية:



أسئلة الفصل التاسع

3 – اذا كان عدد الكتلة لذرة الكلور 35 والعدد

الذري 17 فان عدد الالكترونات يساوي

وعدد البروتونات يساوي

وعدد النيوترونات يساوي

.....

4 – تسمى املاح حامض الهيدروكلوريك بـ

.....


5 – يتفاعل حامض الهيدروكلوريك مع

كاربونات الكالسيوم وت تكون نتيجة

هذا التفاعل المواد الاتية و

..... و

الجدول الدوري للعناصر





الرموز و الأعداد الذرية لبعض العناصر

العدد الذري	الرمز	العنصر	العدد الذري	الرمز	العنصر
99	Es	Einsteinium	89	Ac	Actinium
68	Er	Erbium	13	Al	Aluminium
63	Eu	Europium	95	Am	Americium
100	Fm	Fermium	51	Sb	Antimony
9	F	Fluorine	18	Ar	Argon
87	Fr	Francium	33	As	Arsenic
64	Gd	Gadolinium	85	At	Astatine
31	Ga	Gallium	56	Ba	Barium
32	Ge	Germanium	97	Bk	Berkelium
79	Au	Gold	4	Be	Beryllium
72	Hf	Hafnium	83	Bi	Bismuth
2	He	Helium	5	B	Boron
67	Ho	Holmium	35	Br	Bromine
1	H	Hydrogen	48	Cd	Cadmium
49	In	Indium	20	Ca	Calcium
53	I	Iodine	98	Cf	Californium
77	Ir	Iridium	6	C	Carbon
26	Fe	Iron	58	Ce	Cerium
36	Kr	Krypton	55	Cs	Cesium
57	La	Lanthanum	17	Cl	Chlorine
103	Lr	Lawrencium	24	Cr	Chromium
82	Pb	Lead	27	Co	Cobalt
3	Li	Lithium	29	Cu	Copper
71	Lu	Lutetium	96	Cm	Curium
12	Mg	Magnesium	66	Dy	Dysperosium

الرموز و الأعداد الذرية لبعض العناصر

العدد الذري	الرمز	العنصر	العدد الذري	الرمز	العنصر
44	Ru	Ruthenium	25	Mn	Manganese
62	Sm	Samarium	101	Md	Mendelevium
21	Sc	Scandium	80	Hg	Mercury
34	Se	Selenium	42	Mo	Molybdenum
14	Si	Silicon	60	Nd	Neodymium
47	Ag	Silver	10	Ne	Neon
11	Na	Sodium	93	Np	Neptunium
38	Sr	Strontium	28	Ni	Nickel
16	S	Sulfur	41	Nb	Niobium
73	Ta	Tantalum	7	N	Nitrogen
43	Tc	Technetium	102	No	Nobelium
52	Te	Tellurium	76	Os	Osmium
65	Tb	Terbium	8	O	Oxygen
81	Tl	Thallium	46	Pd	Palladium
90	Th	Thorium	15	P	Phosphorus
69	Tm	Thulium	78	Pt	Platinum
50	Sn	Tin	94	Pu	Plutonium
22	Ti	Titanium	84	Po	Polonium
74	W	Tungsten	19	K	Potassium
92	U	Uranium	59	Pr	Praseodymium
23	V	Vanadium	61	Pm	Promethium
54	Xe	Xenon	91	Pa	Protactinium
70	Yb	Ytterbium	88	Ra	Radium
39	Y	Yttrium	86	Rn	Radon
30	Zn	Zinc	75	Re	Rhenium
40	Zr	Zirconium	45	Rh	Rhodium

تْم بِحَمْبَم